



36<sup>º</sup> CONGRESSO BRASILEIRO DE  
**PEDIATRIA**  
O olhar que prepara para o Futuro



## Trabalhos Científicos

**Título:** Importância Do Reconhecimento Da Lesão Clássica De Leishmaniose Tegumentar Americana: Relato De Caso

**Autores:** RAFAEL MEDEIROS BEZERRA COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE); VIRNA LUÍZA DE SOUZA OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE); ROSANE SILVA DE OLIVEIRA TEIXEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE); MÔNICA CAVALCANTI TRINDADE DE FIGUEIREDO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE); ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE)

**Resumo:** INTRODUÇÃO: A Leishmaniose Tegumentar Americana é uma doença infecciosa crônica, não contagiosa, que acomete pele e mucosas, causada por protozoários do gênero *Leishmania*, transmitida de animais a humanos através da picada do vetor flebotomíneo. Apresenta-se frequentemente como uma úlcera com “bordas em moldura”, podendo se apresentar sob outras formas: úlcero-crostosa, úlcerovegetante, verrucosa, tuberosa, impetigóide, ectimatóide e liquenóide. DESCRIÇÃO DO CASO: V.R.S., masculino, 5 anos, procedente de Arara/PB, compareceu ao serviço pediátrico com queixa de “ferida no braço há 3 meses”. Negava dor, prurido ou febre. O pai apresentava lesão semelhante. Afirmou existência de cachorro doente próximo ao domicílio quando a lesão surgiu. Ao exame, apresentava lesão ulcerada em antebraço direito, única, arredondada, indolor, de bordos elevados, com conteúdo granulomatoso. Sem outras lesões cutâneas ou mucosas. EGB, eupnéico, afebril, hidratado, anictérico. Exame abdominal inocente, afastando associação com a forma visceral da doença. A intradermoreação de Montenegro (IDRM) foi positiva. O teste parasitológico estava indisponível, mas, diante da lesão clássica e IDRM positivo, foi instituído tratamento com glucantime. Não foram realizados mais exames complementares devido à eficácia do tratamento, fato importante na confirmação do diagnóstico. DISCUSSÃO: No Brasil, a LTA é uma das afecções dermatológicas que merece mais atenção, devido à sua magnitude e ao risco de produzir deformidades. Apresenta ampla distribuição, com registro de casos em todas as regiões brasileiras. Há três perfis epidemiológicos: silvestre (transmissão em áreas de vegetação primária); ocupacional ou lazer (associada à exploração desordenada da floresta e derrubada de matas); e rural ou periurbana (em áreas de colonização ou periurbana), sendo este o do relato em questão, em ascensão atualmente. CONCLUSÃO: Em virtude da importância epidemiológica no Brasil, cabe ressaltar a necessidade do conhecimento desta entidade e de suas diversas apresentações clínicas pelo pediatra, em busca do diagnóstico precoce e tratamento adequado dos casos, evitando consequências mutilantes para seus portadores.