Trabalhos Científicos

Título: Variação Da Prevalência Do Eczema Atópico Entre Adolescentes Numa Capital Do Nordeste Do Brasil Em 10 Anos

Autores: MÉRCIA MEDEIROS (UFAL); AUXILIADORA COSTA (UFAL); DIEGO SANTOS (UFAL); KELVYN VITAL (UFAL); PAULA MELLO (UFAL); ANYA ANDRADE (UFAL); ANA SILVA (UFAL); EMILY NASCIMENTO (UFAL); FRANCISCO SOARES (UFAL)

Resumo: OBJETIVOS: Determinar a prevalência de sintomas de eczema entre adolescentes (13-14 anos) e avaliar a tendência temporal, comparando com estudo realizado há 10 anos, em uma capital do Nordeste do Brasil. MÉTODO: Estudo transversal, com aplicação de questionários escritos do ISAAC aos adolescentes. Amostra obtida por meio de sorteio aleatório, respeitando a proporcionalidade entre escolas (públicas e privadas) em cada distrito, envolvendo questões sobre sintomas de eczema. Os dados foram computados num banco de dados EPIINFO versão 3.5.2, através de dupla entrada. Para análise de comparações entre os dados obtidos em 2002 e 2012 foi utilizado o teste do qui-quadrado, com nível de significância estabelecido de 5% ($p< 0,05$). RESULTADOS: Participaram do estudo 3268 adolescentes (taxa de retorno de 93,4%). Em 2002, as prevalências de eczema ativo, eczema flexural, eczema grave e diagnóstico médico foram respectivamente: 7,5%, 4%, 3,3% e 6,3%. Em 2012, estas prevalências foram de 7,9%, 3,9%, 0,73% e 10,9% respectivamente. Houve redução de eczema grave e aumento do diagnóstico médico, estatisticamente significantes. CONCLUSÃO: A análise temporal mostrou um aumento no diagnóstico médico e diminuição da gravidade, o que pode significar um maior acesso ao sistema de saúde, melhor conhecimento pela população e, portanto, um maior controle da doença.