



36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: Associação Do Tempo De Aleitamento Materno Com Diagnóstico De Enurese

Autores: DAYANA MARIA DE OLIVEIRA (UFJF); PATRICIA DAHAN (UFJF); MARIANA DE ALMEIDA BELO (UFJF); LIDYANNE ILÍDIA DA SILVA DE PAULA (UFJF); LILIANA FARJARO OLIVEIRA (UFJF); CAMILA COUTO GOMES (UFJF); LUIZ CARLOS BANDOLI GOMES JUNIOR (HU-UFJF); GRAZIELLI GIGIANE GIGIANE OLIVEIRA SOUSA (HU-UFJF); PATRICIA BORGES GOMES (HU-UFJF); JOSE MURILLO BASTOS NETTO (UFJF)

Resumo: Introdução: A enurese é definida como uma incontinência urinária intermitente durante o sono, considerada como doença após os 5 anos de idade. Além dos fatores de risco já comumente descritos na literatura, outros fatores vêm sendo investigados, entre eles o aleitamento materno por período inferior ao preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que recomenda a amamentação exclusiva por 4-6 meses de vida do bebê e como alimentação complementar até pelo menos o final do primeiro ano de vida. Objetivo: Verificar a associação entre enurese e aleitamento materno, por período inferior ao preconizado pela OMS, em crianças na cidade de Juiz de Fora. Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo, transversal do tipo caso-controle envolvendo crianças de 6 a 14 anos. No grupo Enurese (GE) foram incluídas crianças com enurese primária monossintomática acompanhados no ambulatório de Enurese. Foi aplicado questionário estruturado ao responsável pela criança para identificar fatores biológicos e comportamentais e tempo de aleitamento materno. O grupo controle (GC) foi composto por crianças sem enurese, pareadas por sexo e idade, cujos pais responderam ao mesmo questionário. Não foram incluídos crianças cujo responsável tivesse dificuldade em compreender o questionário, portadores de doenças neurológicas, psiquiátricas e renais. Resultados: A amostra foi de 84 crianças, sendo 42 em cada grupo. A média da idade em anos foi de $8,9 \pm 2,6$ no GE e $9,0 \pm 2,6$ no GC. Cada grupo foi composto de 24 crianças do sexo masculino e 18 do feminino. Quanto ao tempo de amamentação exclusiva, 27 (64,3%) participantes do GE foram amamentadas por tempo inferior ao preconizado pela OMS, enquanto no GC esse valor foi de 17 (30,9%) ($p=0,001$). Conclusão: Os resultados aqui apresentados demonstram que o aleitamento materno por período inferior a 4-6 meses, tempo preconizado pela OMS, pode estar associado à presença de enurese.