



36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: A Importância Do Sistema De Vigilância Epidemiológica Das Paralisias Flácidas Agudas Para A Identificação De Casos De Síndrome De Guillain-barré No Df De 2007 A 2011

Autores: DENIZE BOMFIM (COMITÊ TÉCNICO ASSESSOR PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE); MARIA LUIZA ALMADA MELO (DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL); ANA CARLA BORGES OLIVEIRA (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-SES/DF); ISADORA DE CARVALHO TREVIZIOLI (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-SES/DF); MÌRIAN MARTINS LEAL (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-SES/DF)

Resumo: **INTRODUÇÃO:** A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa causada por poliovírus, que está erradicada do Brasil desde 1989 e atualmente há poucos países com novos casos. O sistema de vigilância das Paralisias Flácidas Agudas (PFA) tem por objetivo manter a poliomielite causada pelo poli vírus selvagem erradicada, permitindo identificarmos outros diagnósticos diferenciais, sendo o principal o de Síndrome de Guillain-Barré (SGB). **OBJETIVOS:** Descrever o perfil epidemiológico dos casos de PFA notificados no período janeiro de 2007 a janeiro de 2011 pelo sistema de vigilância epidemiológica das PFA. **METODOLOGIA:** Realizada análise retrospectiva com dados coletados nas Fichas de Investigação Epidemiológica de PFA, disponibilizadas no SINAN, no período de janeiro de 2007 a janeiro de 2011, a partir de todos os casos de paralisia flácida de início súbito em menor de 15 anos. **RESULTADOS:** Foram 43 casos notificados, sendo o sexo feminino e as crianças entre 1 a 5 anos as mais acometidas. As regionais de saúde da Ceilândia e do Gama tiveram o maior número de casos (respectivamente 28,7% e 14,28%). **CONCLUSÃO:** Os resultados demonstram que a Vigilância da PFA no DF no período de 2007 a 2011 mostrou-se sensível por atingir as metas estipuladas para os indicadores. Outro dado interessante é que a maioria dos caso tiveram o diagnóstico final SGB, de acordo com o descrito na literatura.