



36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: Perfil De 123 Pacientes Portadores De Síndrome Nefrótica Do Hospital Infantil Darcy Vargas

Autores: DEISE TAKAYAMA (HIDV); MARTA MAIA (HIDV); PAULA NUSSEN (HIDV); CLARICE SAHADE (HIDV); FERNANDA SOUZA (HIDV); ILKA PARKER (HIDV); NATALIA ANDREA (HIDV)

Resumo: Introdução: A síndrome nefrótica é uma glomerulopatia comum na infância caracterizada por proteinúria, hipoproteinemia, edema e hiperlipidemia. Em crianças, mais de 80% apresentam a doença de lesões mínimas, que é geralmente responsiva aos corticosteroides e têm excelente prognóstico. Porém devido à não responsividade total ou parcial da patologia ao tratamento proposto em alguns pacientes, há opções de outras classes de medicações, dentre elas ciclofosfamida, ciclosporina, rituximab e outros esquemas terapêuticos. Objetivo: avaliar a resposta terapêutica de 123 pacientes em tratamento de síndrome nefrótica no Hospital Infantil Darcy Vargas. Metodologia detalhada: relato do perfil dos 123 pacientes com síndrome nefrótica em atendimento no Hospital Infantil Darcy Vargas. Resultados: notado predomínio de 30% dos pacientes com idade de início de doença entre 2 anos e 3 anos. Sexo feminino de 50%. 38% dos pacientes cortico dependentes. Sorologias negativas para hep B, C, HIV, sendo apenas 1% positiva para B e C e HIV predominando negativa. 88% C3/C4 normais. Glomerulonefrite por lesões histológicas mínimas comprovadas em biopsia com 19% dos casos. Pacientes que fizeram uso de ciclofosfamida 48%. Tempo predominante de tratamento com Ciclofosfamida de 8 semanas, correspondendo a 44% do total de 25 pacientes com esse tratamento único e com boa resposta. Corticoterapia única ou associada a outros tratamentos de 30% do total de 123 pacientes. Conclusão: a síndrome nefrótica é uma patologia frequente na infância, porém ainda há predominância de responsividade positiva à corticoterapia.