



Trabalhos Científicos

Título: Aleitamento Materno E A Influência Do Perfil Materno No Desmame Precoce Em Um Grupo De Crianças – Df

Autores: ANDREA LOPES RAMIRES KAIRALA (UNI CEUB- DF); MARIANA QUEIROZ SOUZA PEREIRA (FACIPLAC - DF); WANESSA FERNANDES VELOSO (FACIPLAC - DF); NATALIA RAMIRES KAIRALA (UNI CEUB- DF); LUIZ MATHEUS XAVIER COCENTINO (UNI CEUB- DF); WINNIE MANDELA PIMENTEL (UNIVERSIDADE DE BRASILIA); CAROLINE MOHAMED (UNIVERSIDADE DE BRASILIA); ANA CRISTINA BARRETO BEZERRA (UNIVERSIDADE DE BRASILIA)

Resumo: Objetivo: Identificar fatores que interferem no tempo de aleitamento materno exclusivo, ressaltando fatores socioeconômico-culturais que favoreceram ao desmame precoce em um grupo de mães que se predispunham a amamentar. Método: Estudo retrospectivo, análise amostral de 72 crianças entre 6 e 8 anos de idade, em uma escola pública. Aplicado as mães um questionário com as seguintes indagações: idade e escolaridade, primiparidade, renda familiar, tempo de amamentação e a importância que as mesmas davam ao aleitamento materno. Posteriormente realizada análise de prontuário médico e confirmadas essas informações. Resultados: Dessas mulheres 85% afirmaram que a criança mamou no peito. A prevalência do aleitamento materno no primeiro ano de vida foi de 65% e a média de amamentação foi de 15,91 meses. A análise das mulheres que possuíam escolaridade superior ao Ensino Fundamental, mostrou que 80,6% amamentaram por mais de 6 meses, o p-valor gerado foi de 0,001, o que demonstra forte relação entre essas variáveis. O nível de escolaridade influenciou o número de consultas no pré-natal, porém essa relação não foi significativa (p-valor > 0,05). Conclusões: Embora a grande maioria das mães saiba da importância para os seus filhos, do aleitamento materno exclusivo até os seis meses e complementado até os dois anos, a duração do aleitamento materno exclusivo até os seis meses foi de 65,4% e de aleitamento complementado até os dois anos foi de 22%, aquém do preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), existindo não somente uma causa, mas um conjunto de fatores que levam ao desmame precoce.