Trabalhos Científicos

Título: Neumotorax Asociado A Bulla Congénita. A Propósito De Un Caso.

Autores: VIVIANA SOTOMAYOR (HOSPITAL DE CLINICAS. PARAGUAY); SUSANA PALOMAR (HOSPITAL DE CLINICAS. PARAGUAY); ROCIO MORINIGO (HOSPITAL DE CLINICAS. PARAGUAY); SILVIA AGUILAR (HOSPITAL DE CLINICAS. PARAGUAY); JORGE ORTIZ (HOSPITAL DE CLINICAS. PARAGUAY); MELINA SALAS (HOSPITAL DE CLINICAS. PARAGUAY); LETICIA RAMIREZ (HOSPITAL DE CLINICAS. PARAGUAY); SYLVIA GOTZ (HOSPITAL DE CLINICAS. PARAGUAY)

Resumo: El neumotórax espontáneo primario se debe con mayor frecuencia a la presencia de bulas hasta en un 80% de los casos, las cuales son colecciones de aire en el espacio subpleural por ruptura alveolar, habitualmente se presenta en pacientes jóvenes del sexo masculino, de configuración longilínea; con un rango de edad, entre 20-40 años de edad y se incrementa el riesgo en fumadores. Se presenta a continuación un caso asociado a bulla congénita. Presentacion del caso: Paciente de sexo masculino con antecedente previo de internación al nacimiento por distress respiratorio es dada de alta en plan de seguimiento ante diagnostico de bulla congénita. Acude a la urgencia con cuadro de 12 hs de evolución de dificultad respiratoria de inicio brusco. Al ingreso se constata cianosis y taquipnea marcada, torax asimétrico a expensas de abombamiento en hemitorax derecho y silencio auscultatorio. En pulmón derecho se ausculta buena entrada de aire asi como ruidos cardiacos. Se realiza el diagnostico de neumotórax asociado a bulla y se realiza el drenaje con estabilización parcial. Se coloca tubo de drenaje pleural e ingresa a ARM. Paciente desde el ingreso con datos de choque séptico y con reproducción del neumotórax por lo que se sugiere sobreinfección por estafilococo asociada. Comentarios: Existen entidades pulmonares que se conocen como defectos del desarrollo, las más frecuentes son quistes, bulas (burbujas) dentro del pulmón y segmentos separados del pulmón conocidos como secuestros pulmonares. La gran mayoría de estos problemas son detectados durante el desarrollo del individuo, manejándose como problemas del desarrollo e idealmente tratados por los pediatras en conjunto con el cirujano de tórax de niños.