



Trabalhos Científicos

Título: Fatores Associados À Amamentação Por 12 Meses Ou Mais De Idade

Autores: GÉSSICA SILVA SANTANA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA); GRACIETE OLIVEIRA VIEIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA); TATIANA DE OLIVEIRA VIEIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA)

Resumo: Introdução: Apesar da excelência do aleitamento materno (AM) poucas são as mulheres que amamentam os seus filhos além do primeiro ano de vida. Objetivo: Investigar os fatores associados ao AM por 12 meses ou mais de idade. Metodologia: As bases de dados utilizadas foram Pubmed/Medline, Scielo e Lilacs. Os termos de busca incluíram “aleitamento materno, amamentação, breast feeding, breastfeeding, breast milk, human milk, prolong*/*\$, sustain*/*\$, exten*/*\$, continu*/*\$, long-t*/*\$, factor*/*\$, determ*/*\$ e predict*/*\$”; os símbolos (*) e (\$) complementaram as palavras pesquisadas de acordo com o radical. Os filtros utilizados foram espécie humana e ano de publicação entre 2004 e 2014. Foram incluídos artigos que tinham como desfecho o AM aos 12 meses de idade ou mais, escritos em português ou inglês; excluiu-se revisões bibliográficas e estudos qualitativos. As variáveis identificadas foram agrupadas em níveis segundo modelo hierarquizado Resultados: Foram identificados 812 artigos potencialmente relevantes, dos quais foram lidos os títulos e selecionados 116. Desses, 47 foram considerados adequados após a leitura dos resumos; 9 deles foram selecionados para inclusão nesta revisão após a leitura na íntegra. Os anos das pesquisas variaram de 1998 a 2009. Dois deles foram realizados no Brasil. Os tipos de estudo incluíram corte transversal (7) e estudos de coorte (2). Foram identificados 25 fatores associados estatisticamente ao desfecho, sendo as variáveis do nível proximal as mais frequentes (19), seguidas das incluídas no nível distal (16). As variáveis com maior número absoluto de associações foram: maior idade materna, não ter o hábito de fumar, morar em zona urbana/metropolitana e menor renda. Conclusão: É de suma importância a realização de mais estudos brasileiros para conhecermos os fatores associados ao maior tempo da prática do AM em nossa população, a fim de identificar grupos de risco e promover medidas de intervenção visando aumentar a duração da amamentação.