



Trabalhos Científicos

Título: Prevalência De Hábitos Tabagistas E Etilistas Em Mães Com Filhos Com Fissuras Orofaciais

Autores: IGOR MAGALHÃES BARBOSA (UNICHRISTUS); REGINA LÚCIA PORTELA DINIZ (UNICHRISTUS); JOSÉ ORLANDO FERREIRA TOMÉ FILHO (UNICHRISTUS); LARISSA MEIRELES FERNANDES (UNICHRISTUS); THALYS SAMPAIO RODRIGUES (UECE)

Resumo: Objetivo: Sabendo que o aumento da prevalência de hábitos tabagistas e etilistas antes e durante a gestação pode favorecer o surgimento de fissuras orofaciais, esse trabalho objetivou identificar a prevalência de hábitos tabagistas e etilistas em 294 gestantes que tiveram conceptos com fissuras, avaliando o impacto do referido fator de risco na ocorrência desse defeito. Metodologia: Estudo transversal e descritivo, realizado entre os meses de maio e setembro de 2014, em um hospital infantil. Nesse período, foram aplicados questionários às mães de 294 portadores de fissura orofacial, a fim de obter dados referentes à ocorrência de hábitos tabagistas e etilistas antes e durante a gravidez. Resultados/Discussão: Das mães entrevistadas, 34 (11,6%) mencionaram que fumavam antes da gravidez e 18 (6,1%) relataram tal hábito durante a gestação do filho acometido. Foi verificado também que 39 (13,2%) mães tinham hábitos etilistas antes da gravidez e 15 (5,1%) durante a gravidez. Foi notada, então, uma redução desses hábitos durante a gestação. Ao compararmos com um estudo na Noruega, percebeu-se que a prevalência no estudo atual foi menor, pois, naquele país, 41 das mães tinham hábitos tabagistas e 38 tinham hábitos etilistas durante a gestação. Isso pode ser devido à própria prevalência desses hábitos na população em geral daquele País, pois, enquanto que no Brasil a prevalência de fumantes é de aproximadamente 17%, na Noruega é de 30%. Isso sugere que no Brasil existam, provavelmente, outros fatores de risco que contribuem mais para a ocorrência de fissuras, como consanguinidade e genética. Conclusão: Concluímos que outros fatores estão contribuindo mais fortemente para a ocorrência dessas fissuras na população pesquisada. Além disso, etilismo e tabagismo durante a gestação são hábitos mais observados em países onde há uma maior prevalência dos mesmos na população em geral.