



Trabalhos Científicos

Título: Megacólon Psicogênico Em Gêmeos Univitelinos

Autores: RAIANY IASMIM DE ABREU (UNIG); TAÍS SEPÚLVEDA DA CRUZ (UNIG); ANA EDUARDA SOUZA (UNIG); FERNANDA ALVAREZ GENTIL (UNIG); PRISCILA RODRIGUES NÉSPOLI ()

Resumo: Introdução: Megacólon é a dilatação do retossigmóide que pode ser de etiologia congênita ou adquirida. Quanto à etiologia adquirida se sobrepõem os casos de megacólon psicogênico, o qual é uma condição clínica incomum geralmente associada com constipação e trânsito intestinal lento. A constipação pode ser de causa funcional ou orgânica, sendo esta mais associada a doenças neurológicas e distúrbios psiquiátricos. Descrição do caso: Pacientes gêmeos univitelinos masculinos, 6 anos, negros, internados em Hospital de Emergência, apresentando distensão abdominal e constipação intestinal. Ao exame físico ostentavam ausência de queixas álgicas ou náuseas. Uso de laxantes para estimular a defecação. Discussão: Para a triagem dos pacientes foram realizados exames de ultrassonografia do abdômen total, clister opaco (duplo contraste) e cintilografia. Após realização de clister opaco, foi verificado trânsito retrógrado de intestino grosso sem obstáculos, todavia, houve dilatação do retossigmóide associada à indentação posterior do reto, além da presença de resíduos fecais sólidos nas duas crianças. A evolução dos sintomas coincidiu, cronologicamente com a separação violenta dos pais. Sendo assim diagnosticado megacólon idiopático em ambos com causa psicogênica não específica. O tratamento processou-se com drogas pró-cinéticas e risperidona. Conclusão: Existem múltiplas causas que podem levar a constipação crônica em crianças. A observação empírica dos dados clínicos durante a anamnese foi primordial na determinação da etiologia da constipação em ambos os irmãos. Segundo a teoria de Freud, na fase anal, a criança desenvolve traumas que podem repercutir em distúrbios intestinais. A mãe é apontada como mediadora desse processo. Logo a ausência de anormalidade congênita detectável e de sintomas de constipação no início da lactância nos fez concluir que o diagnóstico de megacólon psicogênico se deu pela transferência da ansiedade materna para os dois progenitores.