



Trabalhos Científicos

Título: Cisto Parauretral: Um Relato De Caso Em Hospital Público Na Cidade De São Paulo.

Autores: VINICIUS GARCIA DE FREITAS SANTOS (HOSPITAL MUNICIPAL DR MOYSÉS DEUTSCH); VANESSA KÜPPER TIRLONI (HOSPITAL MUNICIPAL DR MOYSÉS DEUTSCH); MARIANA KEIKO MORIOKA (HOSPITAL MUNICIPAL DR MOYSÉS DEUTSCH); CARLINA AMÉLIA CAVALCANTE BATISTA DE ÁVILA (HOSPITAL MUNICIPAL DR MOYSÉS DEUTSCH); FLAVIA CRISTINA MARTINS OPPENHEIM (HOSPITAL MUNICIPAL DR MOYSÉS DEUTSCH); SILVIA KAWAKAMI PANTALEÃO (HOSPITAL MUNICIPAL DR MOYSÉS DEUTSCH); JOSE JUSSIER DE OLIVEIRA JUNIOR (HOSPITAL MUNICIPAL DR MOYSÉS DEUTSCH)

Resumo: Introdução: O cisto parauretral é uma malformação congênita rara, localizada em torno da uretra em recém nascidos (RN) do sexo feminino, deriva de uma obstrução do Ducto de Skene. Ao exame físico apresenta-se como uma pequena massa, podendo medir de 1 a 3 cm, com coloração amarelada ou esbranquiçada, macia, indolor e na maioria dos casos é assintomático. Na maioria das vezes a conduta é conservadora, uma vez que a regressão espontânea é esperada. Relato do caso: Durante o exame físico de RN do sexo feminino, no 1º dia de vida, observou-se na genitália presença de massa única de cor amarela com 2 cm de diâmetro com pequenos vasos na superfície, indolor, não obstruindo a uretra. Realizado ultrassom abdominal para excluir outras malformações congênitas, sem alterações. Encaminhado para avaliação com a equipe da Cirurgia Pediátrica, sendo diagnosticado cisto parauretral com conduta expectante e encaminhada para o ambulatório da Cirurgia pediátrica para acompanhamento. Discussão: A etiologia é desconhecida, mas a obstrução do ducto Skene como resultado de infecção ou inflamação tem sido considerada. Os diagnósticos diferenciais mais comuns são hímen imperfurado com hidrocolpo, prolapso de uretra e ureteroceles ectópicas. A ultrassonografia é útil para excluir complicações como hidronefrose e além de outras anomalias urogenitais. A complicação mais comum é a obstrução uretral. Não há consenso sobre o tratamento, sendo assim, a intervenção cirúrgica é indicada apenas em casos de obstrução uretral ou regressão retardada. Conclusão: O cisto parauretral é uma malformação congênita rara, benigna com poucas complicações, sendo que a maioria dos casos é assintomática com conduta expectante.