



Trabalhos Científicos

Título: Encefalomielite Disseminada Aguda: Relato De Caso

Autores: KAREN BATISTA (UFT); LIANA MOLLER (HIPP); MARIA REGINA KONKA (HGP); SÁVIA RIBEIRO (UFT); RAPHAEL SILVA (UFT); KAMILLA CARVALHO (UFT); GIGLYANE RAMOS (UFT); EDILMA SILVA (UFT); LEA MIRANDA (UFT); PAULA CARDOSO (UFT)

Resumo: INTRODUÇÃO A Encefalomielite Disseminada Aguda (ADEM) é uma doença desmielinizante do SNC, acometendo principalmente crianças com menos de 10 anos de idade. Caracteriza-se pelo início súbito dos sintomas, podendo ser precedida de vacinação ou infecção viral. DESCRIÇÃO DO CASO ARS, 8 anos, previamente hígido, admitido no HIPP dia 08/06/2015, com quadro de vertigens, incoordenação motora e marcha atáxica de início súbito, precedido de quadro gripal há 10 dias, sem febre ou cefaléia. Apresentava ao exame físico Roomberg positivo, sem demais alterações. Em 10/06/2015, evoluiu com perda de força muscular em hemicorpo E seguido de 3 episódios de crise convulsiva TCG, sendo encaminhado à UTI, onde realizou TC de Crânio que mostrou múltiplas lesões hipotenuantes, principalmente em substância branca de ambos os hemisférios, de aspecto inespecífico, com possibilidade de proc. infeccioso/inflamatório (encefalite), com LCR normal. Retorna da UTI em 12/06/2015, evoluiu estável até 15/06/2015, quando iniciou quadro de agitação psicomotora, sonolência e descerebração, retornando à UTI, onde foi submetido à VM e nova coleta de LCR em 18/06, ainda normal. Realizado RNM de crânio que mostrou múltiplas lesões em hemisférios cerebrais e regiões núcleo-capsulares compatíveis com doença dismielinizante/inflamatória. Em 19/06 aventada a HD de ADEM, sendo iniciado pulsoterapia com Metilprednisolona 30 mg/kg/dia em 5 dias e Albendazol profilático. Em 24/06/2015 foi extubado com desmame de sonda. Como seqüelas apresentava afasia e hemiparesia a E. DISCUSSÃO O caso evidencia uma criança de 8 anos com marcha atáxica de início súbito, precedido de infecção viral de vias aéreas superiores, em que o diagnóstico foi feito correlacionando-se dados da anamnese, exame físico neurológico e exames de imagem. CONCLUSÃO Trata-se de um caso clínico que mostra a relevância do tema devido a sua baixa prevalência, o qual apresenta sua evolução clínica influenciada pelo diagnóstico e tratamento precoce.