



Trabalhos Científicos

Título: Parasitismo Por Ascaris Lumbricoides Associado A Manifestações Pulmonares Em Pré-Escolar.

Autores: EVA GABRIELA NOGUEIRA DE ALMEIDA (HGVC); MAXUELL NUNES PEREIRA (UESB); JULIANA ALVES TEIXEIRA (UESB); SAMUEL HENRIQUE CORRADI GOMES (HMEM); MICAIL LIMA DE MORAES (UESB)

Resumo: Introdução A síndrome de Loeffler é uma doença respiratória transitória causada principalmente por infestações parasitárias. Eosinofilia ocorre em 5-12% dos casos, e geralmente há alteração radiográfica associada. Descrição do Caso I.C.C, masculino, 2 anos, previamente hígido, com febre recorrente e tosse produtiva havia 15 dias, diarreia sem sangue ou muco na primeira semana e vômitos. Exame físico: estertores e redução do murmúrio vesicular em base do hemitórax direito, sibilos difusos e taquipneia. Exames complementares: leucocitose, PCR elevado; radiografias de tórax e abdome: infiltrado pulmonar à direita e imagem em padrão de miolo de pão em topografia de hipocôndrio esquerdo, confirmada por ultrassonografia abdominal com contornos regulares, conteúdo espesso e focos ecogênicos no interior, sugerindo bolo de áscaris. Durante internação, manteve tosse, apresentou vômitos e febre, e eliminou fragmentos brancos nas fezes segundo relato da genitora. O hemograma de controle revelou eosinofilia discreta e manutenção da leucocitose. Foram prescritos nebulização com broncodilatador, mebendazol e óleo mineral. Criança evoluiu com boa aceitação da dieta e eliminou fezes fisiológicas, tendo alta no sexto dia de internação após resolução do quadro. Discussão Ascaridíase é um problema de saúde pública, especialmente nos países em desenvolvimento. 85% das obstruções intestinais parciais ou completas ocorrem entre 1-5 anos, sendo os principais sintomas febre, diarreia/constipação e dor abdominal. Manifestações respiratórias podem ocorrer, decorrentes da migração pulmonar das larvas. Apresentamos paciente sem história de broncoespasmo prévio, com achados clínicos de pneumonia adquirida na comunidade (PAC), que evoluiu com melhora clínica sem antibioticoterapia específica, associados à semiobstrução por áscaris e eosinofilia, sugerindo Síndrome de Loeffler. Conclusão As manifestações clínicas são inespecíficas, por isso é importante considerar Síndrome de Loeffler no diagnóstico diferencial da PAC em pacientes de áreas endêmicas. A eosinofilia nem sempre é significativa, podendo estar ausente. As lesões pulmonares são transitórias e a evolução clínica é benigna e autolimitada.