



Trabalhos Científicos

Título: A Importância Da Semiologia Da Região Cervical: Descrição De Um Caso De Cisto Tireoglosso Em Um Pré-Escolar

Autores: BIANCA DE CAMPOS GIMENES (UNIFOA); PRISCILA VITOR DAS VIRGENS (UNIFOA); ELORA SILVA LOPES LEITÃO (UNIFOA); EDUARDA RODRIGUES DE TOLEDO (UNIFOA); CECÍLIA PEREIRA SILVA (UNIFOA/ HOSPITAL VITA)

Resumo: Introdução: Os cistos do ducto tireoglosso são os mais comuns da região cervical, correspondendo a 70% dos casos. Surgem a partir de um resíduo do ducto tireoglosso, e apresentam-se como um aumento de volume na região anterior do pescoço, ainda que, ocasionalmente, também possa se situar mais lateralmente. Tem como característica a movimentação quando a língua é direcionada para frente e para fora, uma vez que está ligado ao osso hioide. A investigação diagnóstica é importante a fim de excluir outras patologias e possíveis complicações. Relato do caso: Pré-escolar, 3 anos, masculino, branco, é levado ao pronto atendimento por apresentar febre. Durante o exame físico observou-se nódulo na região cervical anterior de consistência cística, firme, indolor e móvel à deglutição e a extrusão da língua. Negou disfagia e odinofagia. A ultrassonografia da região cervical que confirmou imagem cística de contornos regulares, evidenciada na linha média e um pouco a esquerda, preenchida com ecos, medindo 2,4 cm x 1,6 cm x 0,9 cm, sugestiva de cisto tireoglosso. A glândula tireoide se apresentava tópica, móvel à deglutição, de contornos regulares e com ecotextura normal. Realizado tratamento cirúrgico e biópsia. Discussão: O cisto tireoglosso pode surgir desde a infância até a fase adulta, sendo mais comum seu aparecimento até os cinco anos de idade. Manifesta-se como uma massa palpável indolor, de consistência firme, móvel a deglutição e protrusão da língua e de crescimento lento e progressivo. Seu diagnóstico é realizado através do exame físico e auxílio da ultrassonografia. Sua principal complicação é a formação do seio do ducto tireoglosso, ocorrendo devido à infecção do cisto. Conclusão: Diante de uma tumoração da região cervical a semiologia minuciosa contribui para o diagnóstico precoce, importante para um tratamento efetivo e prevenção de complicações.