



Trabalhos Científicos

Título: Tuberculose Extrapulmonar Em Escolar De 5 Anos: Relato De Caso

Autores: LETICIA SILVA SOUZA (HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA); DANIEL MARCIO AMARAL FERREIRA DO VALLE (HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA); MELKA FRANCO GUIMARÃES (HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA); NICOLE FREIRE PERIM (HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA); REBECA COUTO MONTEIRO (HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA); VANESSA PIRES GUERRA (HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA); ANA LUCIA MUNHOZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA)

Resumo: INTRODUÇÃO: A Tuberculose é uma das principais doenças infecciosas, de acometimento mundial, com cerca de 1,8 milhões de óbitos anuais, segundo a Organização Mundial de Saúde. Em 2013, no Brasil, a apresentação Extrapulmonar correspondeu a 12% dos novos casos de Tuberculose. DESCRIÇÃO DO CASO: A.J.O.S., feminino, 5 anos, natural do Ceará, residente na Rocinha, Rio de Janeiro. Há 2 meses iniciou febre diária vespertina, acompanhada de anorexia, linfonodomegalia generalizada e anemia. Encaminhada a um hospital terciário para investigação de quadro clínico. Na admissão, emagrecida, hipocorada, adenomegalia em cadeias cervical, submandibular, axilar e inguinal, deformidades em corpos vertebrais em Radiografia de Abdome, dor em quadril e dificuldade para deambular. Realizou Ultrassonografia e Tomografia Computadorizada de abdome com alterações sugestivas de Tuberculose Ganglionar. Histopatológico de biópsia linfonodal com baciloscopia positiva para BAAR e cultura com Mycobacterium tuberculosis. Iniciado esquema RIPE. Paciente manteve febre, dor óssea e marcha parética. Ressonância de coluna vertebral demonstrou lesão epidural expansiva e extensa, com posterior abordagem pela Neurocirurgia para drenagem de coleções paravertebrais e biópsia. Exames para pesquisa de imunodeficiência normais. Recebeu alta para acompanhamento com Infectologia e Ortopedia Infantil. DISCUSSÃO: A Tuberculose Extrapulmonar mais frequentemente apresenta-se com comprometimento ganglionar. Neste caso a suspeita diagnóstica baseou-se no achado radiológico da lesão em coluna vertebral (Mal de Pott). Iniciado esquema amplo RIPE pela gravidade e extensão das lesões, associado a corticosteroide. O diagnóstico tardio e o comprometimento vertebral gerou sequelas que comprometeram o alinhamento da coluna vertebral e necessidade de órtese para estabilização da coluna. CONCLUSÃO: Tuberculose ainda é uma doença muito prevalente no Brasil, com números de casos bastante expressivos em alguns bairros do município do Rio de Janeiro. Formas extrapulmonares devem ser pensadas no diagnóstico diferencial de lesões ósseas, com comprometimento neurológico, além das formas ganglionares.