



Trabalhos Científicos

Título: Relato De Caso De Toxoplasmose Congênita Com Microftalmia E Amaurose Bilateral

Autores: NATHALIA DIETRICH BAZANELLA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE PAULA - PELOTAS/RS); MARCEU FLORES PINTO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE PAULA - PELOTAS/RS); ROSANGELA DE MATTOS MÜLLER (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE PAULA - PELOTAS/RS)

Resumo: INTRODUÇÃO A toxoplasmose congênita é uma doença infecciosa que resulta da transferência transplacentária do *Toxoplasma gondii* para o concepto, decorrente de infecção primária da mãe durante a gestação ou por reagudização de infecção prévia em mães imunodeprimidas. DESCRIÇÃO DO CASO Paciente recém-nascido, a termo, com peso adequado, Apgar 8 e 9, sem intercorrências durante o parto. Mãe realizou cinco consultas de pré-natal e tinha últimos exames sorológicos realizados no 2º trimestre, os quais eram negativos, inclusive toxoplasmose IgG e IgM. Ao nascimento foram evidenciadas fontanela ampla, microftalmia e alterações do globo ocular. Realizou TC de crânio que apresentou micro calcificações periventriculares e foi avaliado por oftalmologista, sendo diagnosticado com microftalmia congênita e amaurose bilateral. Suspeitando-se de erros inatos do metabolismo, síndrome genética ou infecções congênicas foram solicitados exames, sendo o único resultado alterado toxoplasmose IgG+ e IgM+, confirmando o diagnóstico de toxoplasmose congênita e sendo iniciado tratamento. DISCUSSÃO As maiores taxas desta infecção são relatadas na Europa, América Central, Brasil e África. Os sinais e sintomas da toxoplasmose congênita estão presentes em apenas 10 a 30% das crianças no momento do nascimento. Normalmente, a infecção sintomática resulta de infecção materna primária durante o primeiro trimestre. Os sintomas mais comuns são coriorretinite, anemia, convulsões, calcificação intracraniana, icterícia, febre e hepatoesplenomegalia. CONCLUSÃO A história natural da toxoplasmose congênita sintomática não tratada cursa com comprometimento neurológico ostensivo ou manifestações generalizadas de doença. As sequelas são hidrocefalia, surdez, deficiência intelectual, convulsões, espasticidade ou paralisias, visão severamente prejudicada e até morte. Por ter um prognóstico reservado com risco de tantas sequelas, faz-se necessário a realização de um pré-natal adequado além do diagnóstico precoce no recém-nascido e o tratamento oportuno.