



Trabalhos Científicos

Título: Aleitamento Materno Entre Prematuros Acompanhados Em Serviço Multiprofissional De Referência

Autores: BRUNNELLA ALCÂNTARA CHAGAS DE FREITAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); PRISCILA CARDOSO RAMOS E FERREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); FRANCELLE COSTA GUIMARÃES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); THAINÁ SOUZA ANDRADE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); TATIANA COSTA MARQUES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); LUIZA MAILLO ASSED KIK (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); JEAN CARLOS BRANDÃO STORK (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); LÍGIA COSTA DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); DENISE CRISTINA RODRIGUES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); MIRENE PELOSO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA)

Resumo: Objetivo: analisar variáveis associadas à menor duração do aleitamento materno (AM) entre prematuros acompanhados em ambulatório multiprofissional de referência, recém-implantado no município. Métodos: coorte retrospectiva de prematuros acompanhados em ambulatório de referência, 2010-2015 (n=75). Inclusão: primeira consulta no primeiro mês de idade corrigida, pelo menos três consultas realizadas e última consulta com no mínimo seis meses de idade corrigida. Desfecho: duração do aleitamento materno. Utilizaram-se análise descritiva, curvas de Kaplan-Meier e regressão de Cox. Resultados: a duração mediana do AM entre os prematuros foi de 6,0 meses. O risco de interrupção do AM entre os prematuros de idade gestacional inferior a 32 semanas foi 2,4 vezes em relação aos que nasceram com 32 semanas ou mais (RR 2,44; IC 95% 1,18-5,08; p=0,017) e o risco de interrupção do AM entre prematuros que estavam em AM complementado na primeira consulta ambulatorial foi 2,5 vezes em relação aos que estavam em AM exclusivo (RR 2,52; IC 95% 1,31-4,86; p=0,006). Conclusões: deve-se oferecer acompanhamento e suporte aos prematuros e suas famílias, visando aumentar as taxas de AM exclusivo, especialmente para os nascidos com menos de 32 semanas. A promoção, proteção e apoio ao AM devem ser realizados pela equipe de saúde em todos os níveis de atenção à saúde, iniciando-se no pré-natal e estendendo-se no período de hospitalização e ao longo do acompanhamento ambulatorial.