



Trabalhos Científicos

Título: Pr4Valencia De Aleitamento Materno Exclusivo No Centro De Saude Escola De Santo Andre Sp, Causas De Desmame E Introducao De Alimentacao Complementar

Autores: RENATA MARLI PIRES (FMABC); SCHOEPS DENISE (FMABC); GABRIELA MORAES (FMABC); JESSICA ZAMBELLI (FMABC); LARA BRAGHIERI (FMABC); MARINA SONNENFELD (FMABC); THAIS CRISTINA SOUZA (FMABC)

Resumo: RESUMO: INTRODUÇÃO: O aleitamento materno exclusivo (AME) é a principal forma de alimentação de um recém-nascido, suprimindo suas necessidades nutricionais, metabólicas, imunológicas e de crescimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ao nascer, a criança deve receber AME por seis meses, sem alimentos a mais. Por ser a primeira fase alimentar, é importante meio de prevenção de doenças, da infância à idade adulta, sendo essencial seu seguimento pelas mães. . OBJETIVO: Avaliar a prevalência de AME na faixa etária para a qual é preconizado (0 a 6 meses de vida) no Centro de Saúde Escola Capuava em Santo André – SP. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e observacional que avaliou a presença do aleitamento materno exclusivo em crianças nascidas entre 01/08/2014 e 28/02/2015, pacientes do Centro de Saúde, matriculadas até o dia 10/02/2015 e atendidas até 14/04/2015. Considerou-se data de nascimento, sexo, idade na matrícula, número de consultas na pediatria e no Núcleo Mais Médicos, tempo de AME, alimento introduzido e a causa do desmame. Dados obtidos via análise dos prontuários médicos. RESULTADOS: Apenas 53,42% dos analisados até os seis meses estavam em AME. 70% dos pesquisados não tinham registro da causa de desmame precoce e 52,8% tiveram fórmulas infantis introduzidas após o AME. to. CONCLUSÃO: Apesar dos esforços realizados pelos profissionais do centro de saúde escola, e também nacionais de promoção do AME, tanto prevalência quanto administração deste na população ainda são aquém do esperado. DESCRITORES: Aleitamento, Exclusivo, Prevalência, Capuava