37º CONGRESSO BRASILEIRO DE PEDIATRIA
RIO DE JANEIRO. RJ
12 a 16 de Outubro de 2015

Trabalhos Científicos

Título: Tempo Médio Da Primeira Amamentação Em Uma Coorte Materno-Infantil Em Rio Branco - Ac

Autores: THAÍLA ALVES DOS SANTOS LIMA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE); ANA CAROLINA SÁ DE SOUZA CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE); KATIUSSY EDWIGES PARO SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE); THAISA CASTELLO BRANCO DANZICOURT (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE); DÉBORA MELO AGUIAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE); MELISSA PAOLA DOS ANJOS MOURÃO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE); BÁRBARA TELES CAMELI RODRIGUES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE); FERNANDA ANDRADE MARTINS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE); ANDRÉIA MOREIRA ANDRADE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE); ALANDERSON ALVES RAMALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE)

Resumo: Objetivo: Avaliar o tempo médio até a primeira amamentação, segundo tipo de parto e baixo peso ao nascer em recém-nascidos de Rio Branco/AC. Métodos: Estudo transversal com 314 recém-nascidos de atendimentos públicos e privados nas maternidades de Rio Branco (AC). A coleta de dados ocorreu nos meses de abril e maio de 2015, por meio de entrevista semiestruturada destinada a obter informações socioeconômicas, demográficas e características pré-natais. Os dados foram analisados utilizando o software SPSS 13.0. A pesquisa foi devidamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: Do grupo de gestantes 71% possui renda familiar de 1 a 3 salários mínimos; 43,7% estão na faixa etária entre 25 e 42 anos; 62,3% não são primigestas; 50,6% realizaram de 6 a 8 consultas pré-natal; 91,6% utilizaram o serviço público de saúde. Entre os recém-nascidos 55,4% nasceram de parto normal e 91,2% apresentaram baixo peso ao nascer. O tempo médio encontrado até a primeira amamentação foi de 151,28 minutos (desvio padrão = 348,52). Ao comparar o tempo médio da primeira amamentação segundo o número de consultas pré-natais, primigestação, atendimento no parto e baixo peso ao nascer, observou-se que os recém-nascidos de parto cesáreo obtiveram média de 276,21 minutos ($p<0,001$) até a primeira amamentação e entre os que apresentaram baixo peso ao nascer esta foi de 328,18 minutos ($p=0,014$), enquanto aqueles de parto normal obtiveram média de 58,27 minutos e os que não apresentaram baixo peso ao nascer levaram em média 138,71 minutos para receber a primeira amamentação. Não houveram diferenças estatisticamente significantes no tempo médio para a primeira amamentação na primigestação (156,05 minutos). Conclusão: De acordo com o presente estudo, podem ser considerados fatores de risco associados a demora para o início do aleitamento materno o tipo de parto cesáreo e o baixo peso ao nascer.