



## Trabalhos Científicos

**Título:** Tireóide Lingual

**Autores:** EVELISE DE OLIVEIRA PROENÇA (PUC-SP); ALCINDA ARANHA NIGRI (PUC-SP); CAROLINE REICHE (PUC-SP); CYNTIA WATANABE (PUC-SP); CINDY BRUGINSKI ESCUDERI (PUC-SP); ISABELLA CRISTINA PALIARES (PUC-SP); DANIELE MACIEL ALEVATO (PUC-SP); JULIANA DE ABREU BARBIERI (PUC-SP); ANA CRISTINA RIOS SEVERINO MARTINS (PUC-SP); LUCIANA SCALLI DUARTE (PUC-SP)

**Resumo:** Introdução: A tireoide ectópica ocorre devido à migração incompleta do tecido tireóideo na embriogênese, localizando-se em qualquer ponto entre o forame cego e a região caudal do pescoço. A Tireóide lingual (30% dos casos de tireóide ectópica) é definida como tecido glandular tireoideo localizado na base média da língua. Relato do caso: criança 2 anos e 8 meses, feminina, nascida de parto normal, termo, com peso adequado, sem intercorrência perinatal. Com 1 ano e 4 meses iniciou com disfagia para alimentos sólidos, tosse seca esporádica, sem febre. O desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Exame físico BEG, Peso entre P 25-50 e comprimento entre P50-75, fácies incomum com hiperemia na base da língua com dimensões de 2 x 1,5cm com cisto no centro da massa. T4L 1,37 ng/dL (0,93 -1,70), TSH 8,56 uUI/mL (0,7-6,0); e cintilografia da tireóide com pertecnato-99mTc tireoide ectópica, na linha média junto à base da língua, morfologia alterada e volume reduzido. Iniciado tratamento com levotiroxina com bom resultado. Discussão: Acredita-se que anticorpos antitireoideanos dificultariam a descida da glândula tireoide durante a embriogênese. A incidência varia de 1:3.000 a 1:100.000, com predominância no gênero feminino 3:1 a 7:1. Quadro clínico depende da localização do tecido ectópico. Em geral com obstrução de vias aéreas ou angústia respiratória em crianças, disfagia, hemoptise, tosse, dor, disфонia, dispnéia e, até mesmo, apnéia do sono em adultos. As provas de função da tireóide podem apresentar-se normais, sendo a cintilografia com tecnécio o teste para confirmação. Conclusão: Os casos de tireóide ectópica podem ser assintomáticos ou ocorrer sintomas relacionados com o tamanho e localização do tumor, como a disfagia que ocorreu neste caso relatado. Cintilografia da tireoide desempenha um papel importante no estabelecimento do diagnóstico.