



Trabalhos Científicos

Título: Bridas De Ladd: Diagnóstico Diferencial Nas Obstruções Intestinais

Autores: MARIA CLARA DE ASSIS GALHARDO (UNITAU); JOÃO CARLOS DINIZ (UNITAU); CAROLINA PEREIRA SUTUGO MONTEIRO DOS SANTOS (UNITAU); FLAVIA DRUMMOND GUINA (UNITAU); TIAGO ARRUDA MAXIMO (UNITAU); MARCELO MARINHO DE OLIVEIRA SARDINHA (UNITAU); LARISSA DE SOUZA MAIA (UNITAU); MARIA ALICE PULGA (UNITAU); MARIANNE FOGAÇA (UNITAU); ADRIANA DE OLIVEIRA MUKAI (UNITAU)

Resumo: Introdução: Os processos obstrutivos congênitos são raros e classificados como mecânicos e funcionais. Os processos obstrutivos mais frequentes são: atresia intestinal, rotação intestinal incompleta, Doença de Hirschsprung, Síndrome da Rolha meconial e Íleo Meconial. Na rotação intestinal incompleta as manifestações clínicas ocorrem na presença de complicações, como a obstrução duodenal crônica, que apresenta sinais clínicos quando as bridas de Ladd aderências que fixam o cólon à parede pósterolateral direita do abdome passando por sobre o duodeno) comprimem a segunda porção duodenal causando vômitos biliosos, distensão abdominal e dor epigástrica. A dificuldade no diagnóstico de processos obstrutivos incentivou a descrição deste caso clínico. Relato de caso: Lactente, masculino, 2 meses e 5 dias, admitido por quadro de vômitos biliosos em grande quantidade, não relacionados às mamadas. Apresenta episódios recorrentes de vômitos desde o 2º dia de vida e permaneceu em UTI neonatal por 2 meses para investigação dos referidos vômitos, com hipóteses iniciais de DRGE e alergia à proteína heteróloga. Após readmissão, afastado processo infeccioso, distúrbios metabólicos e eletrolíticos. Ao exame clínico apresentava-se apenas emagrecido. O estudo ultrassonográfico foi normal e o exame contrastado (transito intestinal) evidenciou imagem sugestiva de processo obstrutivo em nível duodenal. Aventou-se a hipótese diagnóstica de Bridas de Ladd. Recebeu intervenção cirúrgica onde foram visualizadas múltiplas aderências em ceco e cólon, compatíveis com Bridas de Ladd. No pós-operatório apresentou boa evolução. Discussão: Os processos obstrutivos congênitos são raros e podem ter evolução crônica, e por mimetizarem doenças não cirúrgicas dificultam o diagnóstico. O quadro descrito é compatível com processo obstrutivo crônico, onde as hipóteses infecciosas e metabólicas foram descartadas e assim, com auxílio radiológico simples com contraste procedeu-se o diagnóstico de Bridas de Ladd. Conclusão: Concluiu-se que processos obstrutivos crônicos, mesmo que raros devem ser considerados, após descartar outros processos que cursam com vômitos intermitentes.