



Trabalhos Científicos

Título: Teratoma Cístico Maduro De 27Cm Em Pré- Púbere: Relato De Caso

Autores: SARAH MIDIÃ BORGES CORREIA (FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO); RAFAEL FELIPE MACIEL ANDRADE (FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO)

Resumo: **INTRODUÇÃO:** Lesões ovarianas na infância são incomuns, sendo que as lesões benignas e malignas do ovário têm incidência de 2,6 por 100.000 meninas menores que 15 anos. Os tumores de células germinativas em crianças são raros, correspondendo a aproximadamente 3% das neoplasias. Destas, 40% são teratomas maduros ou imaturos, geralmente bilaterais. **RELATO DE CASO:** Feminino, 10 anos, pré-púbere, chega ao serviço de emergência relatando dor em abdômen inferior à esquerda há 05 dias. Fez uso de analgésico com alívio momentâneo. Após 01 dia houve piora da distensão; Ao exame físico, o abdômen era globoso, distendido, rígido com ruídos hidroaéreos abolidos. Massa palpável mal delimitada, extensa e endurecida em abdômen inferior esquerdo. Exames laboratoriais foram normais e Beta hCG negativo. Radiografia de abdômen agudo demonstrou velamento do aspecto mediano do abdômen em epigástrio e mesogástrio, deslocando as alças para a periferia. Ultrassom abdominal total: Lesão expansiva abdômino-pélvica volumosa em linha média. Ressonância nuclear de abdômen e pelve feminina: Lesão expansiva abdômino-pélvica, sólido-cística, multisseptada, com porção sólida e heterogênea. Realizada a cirurgia de anexectomia à esquerda. O ovário pesou 2710 g e mediu 27 X 17 x 9,5 cm. A histologia mostrou teratoma cístico maduro. Atualmente, paciente encontra-se em acompanhamento no ambulatório de oncologia pediátrica. **DISCUSSÃO:** Teratoma cístico maduro é uma neoplasia rara em crianças com sintomatologia variável, cujo método diagnóstico de eleição é a ultrasonografia. A combinação deste exame com radiografia simples de abdome proporciona maior exatidão ao diagnóstico. A ressonância magnética ou a tomografia podem ser utilizadas no diagnóstico diferencial com outras lesões. O tratamento é cirúrgico na maioria dos casos e o prognóstico é bom. **CONCLUSÃO:** O teratoma cístico maduro é uma neoplasia pediátrica rara e para seu diagnóstico é necessária correlação clínica-imaginológica. Seu tratamento definitivo é cirúrgico e deve ser o mais precoce possível, devido à possibilidade de malignização.