



Trabalhos Científicos

Título: Acompanhamento A Longo Prazo De Um Paciente Com Síndrome De Prune Belly - Uma Abordagem Multidisplinar

Autores: CAROLINE PAIVA (INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA); NATHALIA MARCY (INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA); GUACIRA FONSECA (INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA)

Resumo: Acompanhamento a longo prazo de um paciente com Síndrome de Prune-Belly – Uma abordagem multidisciplinar Paiva, C.G; Marcy, N.B.C; Mynssen, G Introdução A síndrome de Prune-Belly é uma anomalia rara, predomina no sexo masculino, apresenta deficiência da musculatura abdominal com anormalidades do trato urinário e criptorquidia. Descrição Relatamos o caso de um paciente de quatorze anos, sexo masculino, acompanhado no serviço de pediatria, cirurgia pediátrica, nutrição, fisioterapia, nefrologia pediátrica e psicologia. Ao exame físico neonatal apresentava abdome em “ameixa”, rins e bexiga palpáveis e, criptorquidia. No sétimo dia de vida foi realizada a vesicostomia devido à dilatação do sistema pielocalicial. Realizou ultrassonografias de vias urinárias seriadas nos primeiros dois anos de vida devido refluxo vesico-ureteral bilateral grau IV, perda da dissociação córtico-medular associada a formações císticas renais. Foram realizadas diversas cintilografias renais, uretrocistografias miccionais, videourodinâmicas, e exames laboratoriais durante o seu acompanhamento. Aos três anos fez correção cirúrgica da vesicostomia e passou a urinar em três tempos com manobra de Vasalva. Com o decorrer dos anos, apresentou ganho ponderal excessivo por alimentação inadequada e pressão arterial acima do percentil 90 para a idade, sendo necessário o acompanhamento com a nutricionista. A hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. nestes pacientes piora a função renal. Aos quatorze anos realizou cirurgia plástica para reparo da musculatura abdominal. Discussão A descrição do caso revela a necessidade de acompanhamento especializado e intervenções precoces nas crianças portadoras de uropatias obstrutivas congênitas graves. Com a chegada da adolescência houve valorização da imagem e surgimento da sexualidade, surgiu quadro depressivo, neste contexto a realização da cirurgia plástica do abdome e acompanhamento psicológico foram necessários. Conclusão O acompanhamento precoce, especializado e multidisciplinar, permite a sobrevida com qualidade, crescimento e manutenção da função renal em pacientes portadores de uropatias congênitas graves e possível diminuição da necessidade de transplante renal precoce.