



Trabalhos Científicos

Título: Prevalência De Dermatodes Neonatais Em Uma Maternidade Publica De Curitiba- Pr

Autores: CRISTINA OKAMOTO (UNIVERSIDADE POSITIVO); ELISA MICHEL (UNIVERSIDADE POSITIVO); JULIA FELDMANN (UNIVERSIDADE POSITIVO); JULIO DE BONI (UNIVERSIDADE POSITIVO); FERNANDA SINKOS (UNIVERSIDADE POSITIVO); CARLOS OLDENBURG (UNIVERSIDADE POSITIVO); KATIA PURIM (UNIVERSIDADE POSTIVO)

Resumo: **INTRODUÇÃO** O período neonatal precoce apresenta alterações fisiológicas decorrentes da transição à vida extrauterina. A pele é um marcador dessa adaptação; portanto as afecções cutâneas são amplamente incidentes. **OBJETIVO** Avaliar a prevalência de afecções cutâneas congênitas e adquiridas no período neonatal precoce e relacioná-la a dados obstétricos da puérpera, ambos em alojamento conjunto de uma maternidade pública de Curitiba- PR. **METODOLOGIA** Estudo transversal prospectivo realizado no primeiro semestre de 2015 que avaliou a presença de afecções cutâneas em 48 recém-nascidos (RN) de até sete dias de vida. Coleta de dados por meio da inspeção do RN e aplicação de questionário socioeconômico na puérpera. Foram excluídos do estudo mães menores de 18 anos ou que não preencheram o TCLE. **RESULTADOS** Foram examinados 48 RNs de até 7 dias de vida, dentre os quais 8,33% eram do sexo masculino e 41,66% do sexo feminino. A média de dias de vida foi de $1,208 \pm 0,79$. A média do peso de nascimento foi $3372,60 \pm 402,71$ g. O perfil obstétrico contabilizou 25% primíparas e 75% multíparas. A média de idade materna foi $25,56 \pm 5,50$. O tipo de parto foi 29,16% cesariana e 70,83% vaginal. 43 RNs (89,83%) apresentaram afecções cutâneas. Desses, 9RNs (18,75%) tiveram uma alteração e 34RNs (70,83%) mais de uma alteração. Houve 14 tipos de alterações, cujas prevalências são: miliária(27RN); mancha salmão(15RN);sudâmina(8RN); descamação(4RN); exantema de fraldas(4RN); mancha mongólica(4RN); acne(2RN); outras alterações cada (1 RN-hemangioma, rubor, telangectasia). **CONCLUSÃO** Os resultados estão em concordância com dados da literatura que relatam incidência de alterações em aproximadamente 90% dos RNs, sendo as mais prevalentes as de glândulas sebáceas, mancha salmão e sudâmina. Não havendo diferença nos cuidados entre primíparas e multíparas