



Trabalhos Científicos

Título: Anomalia De Ebstein: Um Relato De Caso

Autores: FRANCIELLE CAROLINA DEL CASTANHEL (UNIFESO); SIMONE RODRIGUES (UNIFESO); CARLA DOS SANTOS CAMPOS FIGUEIREDO (UNIFESO); THAMYRIS CAMPOS PESSOA (UNIFESO); ANA CRISTINA MOREIRA JORGE GHAZALI (UNIFESO); JULIANA LINHARES DE OLIVEIRA EMERICK (UNIFESO)

Resumo: Introdução: A anomalia de Ebstein, é uma doença cardíaca congênita cianótica, que consiste na implantação baixa da válvula tricúspide de forma anormal para dentro da cavidade do ventrículo direito. A gravidade dos sintomas e o grau de cianose são variáveis e dependem da extensão do desvio da valva tricúspide e do grau de obstrução da via de saída ventricular direita. Relato de caso: H.A.S., masculino, nascido de parto vaginal, à termo, peso: 3.300g, APGAR 5/8 e teste do coraçãozinho MSD: 83% e MID: 95%, sem sopro. Com 18 dias de vida, em consulta com a cardiopediatra, foi evidenciado um ictus de VD predominante, ritmo cardíaco regular, taquicardia supraventricular e cianose, sendo encaminhado para internação e realizada cardioversão química. O ecocardiograma revelou: predominância de insuficiência valvar leve/moderada e função ventricular preservada; válvula tricúspide com folhetos lateral e posterior alongados com baixa implantação e refluxo leve/moderado; VD com dimensões reduzidas devido à atrialização parcial causada pela baixa implantação. Hoje com 13 meses, em uso de Furosemida (1,5 mg/kg/ dia) 12/12 h e Propranolol (3,0 mg/kg/dia) 6/6 h mantendo-se estável. Discussão: O diagnóstico é ainda difícil de ser realizado. Por se tratar de uma doença rara, a grande maioria dos clínicos a desconhece. Para que mais casos possam ser diagnosticados precocemente, é importante a realização do ecocardiódoppler, seja fetal ou pós-natal. Lembrar a necessidade da realização de um exame físico minucioso e do “teste do coraçãozinho” antes da alta hospitalar. Conclusão: É importante o diagnóstico precoce dessa doença, uma vez que mesmo apresentando graus variáveis de gravidade e algumas vezes até um prognóstico reservado, o acompanhamento clínico é essencial para a manutenção da estabilidade do paciente.