



Trabalhos Científicos

Título: Perfil Clínico, Genético E Relação Idade Materna De Nascidos Com Malformação Congênita No Aparelho Digestivo Na Maternidade Publica Na Cidade De Manaus No Período De 2010 A 2013.

Autores: LARISSA NASCIMENTO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS); GABRIELA BENTES SOUSA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS); CARLOS AUGUSTO SILVA ARAÚJO JUNIOR (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS); LILIAM BARROSO CARVALHO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS); KATE SAMILA VASQUES (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS); MARCELO LASMAR SANTOS (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS); NATANAEL MARTINS GOMES (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS); CLEITON FANTIN (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS)

Resumo: Objetivo: Identificar e analisar os casos malformação congênita do aparelho digestivo ocorridos nos anos de 2010 a 2013 em uma maternidade pública de Manaus de acordo com variáveis relacionadas aos diagnósticos clínicos, citogenéticos, gestacionais e pré-natais. Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo baseados em Declarações de Nascidos Vivos (DNV) e prontuários médicos arquivados na maternidade. Os casos de malformações congênitas gastrointestinais foram filtrados a partir de todos os tipos de malformações congênitas, encontrados por meio dos registros dos neonatologistas. Resultados: Entre os anos de 2010 a 2013, registrou-se 15.621 nascimentos, destes, 18 casos apresentaram malformação congênita no aparelho digestivo. O perfil dos recém-nascidos eram de 50 do sexo masculino e 50 feminino, sendo 72,2 atermos com índice de Apgar no primeiro e no quinto minuto menores que sete (82 e 18 respectivamente), no qual 56 dos recém-nascidos tinham peso insuficiente e 44 baixo peso. A maioria das malformações congênitas relacionadas ao aparelho digestório encontradas nos prontuários eram de 78 gastroquise e 22 de onfalocele. Quanto à idade de gestação e parto, notou-se que as mães tinham idade entre 15 e 19 anos eram de 44,44, enquanto 20 a 25 anos com mesmo índice 44,44 e apenas 5,5 na faixa etária maior que 30 anos, sendo 83 dos casos nascidos de parto cesário. As mães que tinham de 4 a 6 consultas pré-natais somavam 56, enquanto 44 relatou ter menos de 4 consultas. Conclusão: Portanto, através de prontuários, conseguiu-se com êxito, traçar o perfil de malformação congênitas do aparelho digestivo na maternidade pública de Manaus, no qual os casos de gastroquise, foram maiores em mães com idade inferior a 19 anos, com menos de 4 a 6 consultas pré-natais, nascidos de parto cesário, atermos e com peso insuficiente.