37º CONGRESSO BRASILEIRO DE PEDIATRIA
RIO DE JANEIRO. RJ
12 a 16 de Outubro de 2015

Trabalhos Científicos

Título: Body Stalk - Relato De Um Caso Raro

Autores: ILIANA BARBOSA ANDRETTA (SANTA CASA DE PARANAVAI); KARINA SIRENA VANDRESEN (SANTA CASA DE PARANAVAI); DALILLA SILVA SANTOS (SANTA CASA DE PARANAVAI); SUMAYA JORGE SCHIMITZ (SANTA CASA DE PARANAVAI); CARLA LUÍSA MARTINS JOCK (SANTA CASA DE PARANAVAI); CAROLINA MARAGNO FERNANDES (SANTA CASA DE PARANAVAI); JAQUELINE SOARES STUANI (SANTA CASA DE PARANAVAI); DANIELA FRAZATTO DE CARVALHO (SANTA CASA DE PARANAVAI); CRISTIANE CONSALTER RICHTER (SANTA CASA DE PARANAVAI)

Resumo: RN, 34 semanas, sexo feminino. Mãe 17 anos, primigesta. Pré natal com sorologias negativas, diagnóstico ultrassonográfico de exotropia cardíaca e gastrosquise. Nasceu de parto cesárea apresentando exteriorização de coração, pulmões, fígado, estômago e alças intestinais, fáscie sindrómica, implantação baixa de orelhas, excesso de pele em pescoço e pé torto. Apgar no 1º minuto:2/ 3º: 3/ 5º: 1. Perímetro cefálico: 33 cm, perímetro torácico: 21 cm, perímetro abdominal: 18 cm. Peso: 1755 gramas, estatura: 37 cm. Realizado manobras de rotina em sala de parto, IOT, adrenalina no tubo 2x. Transferido para UTI neonatal, mantido intubado apresentando distensão das alças intestinais e sangramento de vasos do mesentério. Indo a óbito com 32 minutos de vida. Body stalk é uma anomalia torácica e abdominal sempre letal. O diagnóstico pre-natal é importante pois permite a interrupção da gravidez. Os órgãos torácoabdominais encontram-se fora da cavidade e estão contidos por uma membrana amnioperitoneal ligados diretamente à placenta. O cordão umbilical pode ser ausente ou extremamente curto. Essa anomalia se deve a defeitos na embriogenese. Sua prevalência é de 0,4 a 3,2 % a cada 100.000 natimortos e é mais comum em gestações gemelares. Na literatura só existem 2 casos relatados com cariótipo anormal.