



Trabalhos Científicos

Título: Estudo Do Perfil Epidemiológico Dos Pacientes Pediátricos Lactentes (0 A 2 Anos) Realizados Em Hospital Pediátrico Público Em Manaus No Ano De 2014.

Autores: LIESELOTTE GUIMARÃES SOARES (UEA); FABRICIO VIANA NEIVA (UEA); ADRIANA TÁVORA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA (UEA); GABRIELA BENTES DE SOUSA (UEA); ANNE JULIE DE ALENCAR STONE (UEA); ANDRÉ FELIPE DE SOUZA STONE (UEA); FABRICIA LOUZADA DEPIZZOL VITO SOBRINHO (UEA); MARCELO LASMAR DOS SANTOS (UEA); MAIZA LASMAR DOS SANTOS (UEA); SHIRLEN SILVA LIMA (UEA)

Resumo: Análise do perfil clínico-epidemiológico de crianças, de 0 a 2 anos, diagnosticadas com Pneumonia, internadas em hospital de referência em Manaus-AM, de Janeiro a Dezembro de 2014, por meio de estudo retrospectivo, transversal, de levantamento de 272 prontuários. As variáveis analisadas foram agrupadas em dados demográficos, clínicos e da internação. No total, 52,6% dos casos eram do sexo masculino, idade média $1,16 \pm 0,67$ anos, nascidas de parto vaginal (61%), a termo (87,1%) com calendário vacinal atualizado (xx%). Os achados clínicos mais frequentes foram: tosse (92,27%), dispnéia (68,75%), febre (68%), roncospasmos a ausculta respiratória (45,5%) e crepitações (37,50%). Em 5,27% houve complicações, sendo derrame pleural (2,11%) a mais comum. As doenças de base mais prevalentes foram as cardiopatias congênitas (29,16%). Embora 94,8% das crianças estivessem eutróficas, 4% tinham história de pneumonias prévias. Infiltrado radiológico difuso (56,6%) foi o achado radiográfico mais frequente. O tempo médio de internação hospitalar (IH) foi de $7,9 \pm 5,97$ dias. Apesar da penicilina cristalina (62,13%) ter sido a primeira escolha de tratamento, foi necessário iniciar segundo (29,7%) e terceiro (19,7%) novos esquemas. Ceftriaxona (35,8%) e associação de Cefepime e Amicacina (37,5%) foram os antibióticos mais utilizados no segundo e terceiro novos esquemas, respectivamente. O tempo médio para a decisão de mudança do antibiótico foi de $5,36 \pm 2,83$ dias para a primeira, e de $8,6 \pm 2,56$ dias para segunda substituição. Aproximadamente 97,8% dos pacientes receberam alta em bom estado geral, porém 1,47% apresentaram complicações graves e evoluíram para óbito, em média com $13 \pm 11,91$ dias de IH. A pneumonia é uma das principais causas de morbi-mortalidade na primeira infância. O manejo adequado e a correta escolha da antibioticoterapia são relevantes para a sobrevida destes lactentes e redução do tempo de internação hospitalar.