



Trabalhos Científicos

Título: Caracterização Do Aleitamento Materno Em Recém-Nascidos De Baixo Peso Atendidos No Ambulatório Da Terceira Etapa Do Método Canguru

Autores: MARIA BEATRIZ REINERT DO NASCIMENTO (MATERNIDADE DARCY VARGAS/UNIVILLE); MARCO ANTONIO MOURA REIS (MATERNIDADE DARCY VARGAS/UNIVILLE); FERNANDA DO AMARAL VERBINEN NUNES (MATERNIDADE DARCY VARGA); CAMILA NORONHA HASSE (UNIVILLE); CAMILA SMEKATZ SIMÃO (UNIVILLE); JÉSSICA DE ANDRADE (UNIVILLE)

Resumo: Objetivo: Caracterizar o tipo de alimentação entre recém-nascidos de baixo peso desde a alta da unidade neonatal e durante a terceira etapa do Método Canguru. Método: Trata-se de um estudo retrospectivo de recém-nascidos de baixo peso, submetidos ao Método Canguru, em uma maternidade de grande porte. As variáveis pesquisadas foram: sexo, peso de nascimento, idade gestacional, permanência hospitalar e em seguimento ambulatorial, peso de alta da unidade neonatal e da etapa ambulatorial, alimentação por ocasião da alta da unidade neonatal e da terceira etapa do Método Canguru. Resultados: Foram estudados 23 recém-nascidos masculinos (43,4%) e 30 recém-nascidos femininos (56,6%). O peso ao nascimento variou entre 570g e 2000g (média = 1397,3g \pm 348,6g). A idade gestacional oscilou entre 24 e 35 semanas (média = 31 semanas \pm 2 semanas e 3 dias). O tempo de internação hospitalar foi de 12 a 104 dias (média = 42,2 dias \pm 23,6 dias). O peso médio de alta foi de 2024,4g (DP = \pm 145,1g). A frequência do aleitamento materno por ocasião da alta da unidade neonatal de risco foi de 96,2%, sendo que as taxas de amamentação exclusiva, mista e desmame foram, respectivamente, 81,1%, 15,1% e 3,8%. A permanência na terceira etapa foi em média de 21,4 dias (DP = \pm 9,3 dias), com ganho de peso médio de 31,3g/dia. Ao momento da alta da terceira etapa, observou-se um peso médio de 2628,7g (DP = \pm 131,9g), sendo que 67,3% dos pacientes estavam em amamentação exclusiva. Conclusão: Embora 81,1% dos recém-nascidos de baixo peso tenham recebido alta hospitalar em aleitamento materno exclusivo, apenas 67,3% deles continuava mamando exclusivamente na alta da terceira etapa do Método Canguru.