Trabalhos Científicos

Título: Coinfecção Leishmania-Hiv Em Menores De 15 Anos: Aspectos Epidemiológicos Em Uma Cidade No Interior Do Estado Do Ceará Dos Anos De 2007 A 2016.

Autores: MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO DE CASTRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS SOBRAL); LORENA ALVES TRAJANO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS SOBRAL); FRANCISCO IGOR FERREIRA SIQUEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS SOBRAL); MIGUEL MARCELO FREIRE DE MELO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS SOBRAL); CLARA QUEIROZ DOS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS SOBRAL); ROBERTA CAVALCANTE MUNIZ LIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS SOBRAL)

Resumo: OBJETIVOS: Analisar os aspectos epidemiológicos da Coinfecção Leishmania-HIV em menores de 15 anos na cidade de Sobral, localizada no interior do estado do Ceará, nos anos de 2007 a 2016, no que concerne à idade, ano de diagnóstico e comparabilidade ao total de casos de Leishmania visceral dentro da faixa etária estudada no período avaliado. MÉTODOS: Foram estudados dados da plataforma Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN NET) da Secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, referentes ao período de 2007 a 2016. As informações foram filtradas para crianças menores de 15 anos, residentes na cidade de Sobral, localizada no interior do Ceará, diferenciando-as quanto à faixa etária e ano de diagnóstico. RESULTADOS: Em relação ao número de diagnóstico referentes à coinfecção Leishmania-HIV, houve o total de 1 caso, o qual foi diagnosticado no ano de 2011, ano o qual o total de crianças com o diagnóstico de Leishmania Visceral foi de 17, representando, por tanto, 5,88% do total de casos no ano. No que diz respeito à faixa etária, o caso faz parte da faixa etária de 1-4 anos, faixa etária a qual o total de diagnósticos de Leishmania Visceral no período estudado foi de 78 casos. CONCLUSÃO: Apesar de apenas um diagnóstico ter sido documentado no período, tal caso é de alta relevância considerando as estimativas gerais da população brasileira e o prognóstico de tal diagnóstico, isso porque essa coinfecção é considerada doença emergente de alta gravidade em várias regiões do mundo. Além disso, a associação entre leishmaniose e AIDS é recente e apresenta um número crescente de casos no Brasil e no mundo, por isso, deve-se ter máxima atenção com o aparecimento de novos casos, principalmente em faixas etárias mais vulneráveis, como o caso supracitado.