



Trabalhos Científicos

Título: Risco Para Transtornos Mentais Em Crianças E Adolescentes Com Dermatite Atópica

Autores: MARIANA MUZZOLON (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ); VÂNIA OLIVEIRA DE CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ); SANDRA REGINA BAGGIO MUZZOLON (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ); MÔNICA NUNES LIMA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ)

Resumo: A dermatite atópica (DA) é uma doença crônica e recidivante, que afeta a imagem corporal, ocasionando problemas emocionais e psicossociais comparados com seus pares. Catal et al. (2016) avaliaram que 68,8% das crianças com DA apresentaram pelo menos um diagnóstico psiquiátrico. O Child Behavior Checklist – ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) CBCL (1991) é um instrumento composto por escalas com métodos quantitativos para avaliar problemas emocionais e sociais, considerado risco para Transtorno Mental (TM) quando o escore é ≥ 70 pontos. Objetivo: identificar problemas emocionais e sociais em crianças e/ou adolescentes com DA. Métodos: Estudo caso-controle, transversal, prospectivo de 100 pacientes com DA, com os critérios clínicos para DA de Hanifin e Radjka (1980) e 50 irmãos sem o diagnóstico clínico de DA que responderam ao CBCL no período de maio de 2016 a abril de 2017. Os pacientes foram submetidos à avaliação da gravidade da dermatose por meio do índice de SCORAD (2007) e classificada: leve (pontuação < 25), moderada (≥ 25 à ≤ 50) ou grave (> 50). Foram aplicados os testes Qui-quadrado de Pearson com correção de Yates e testes de Mann-Whitney, considerando o nível de significância de 5% (Statistica 10.0 ®). Resultados: Participaram 100 pacientes e 50 irmãos e havia nível de risco para TM pelo CBCL em 63% dos pacientes e 36% dos irmãos ($p=0,01$). Houve maior frequência de riscos para TM nos pacientes com DA comparando com seus irmãos para os Problemas de Pensamento (49,1% versus 20,0%, $p < 0,001$) e Problemas de Sono (60,5% versus 11,76%, $p < 0,001$). A gravidade da dermatite atópica não interferiu no risco para TM ($p=0,86$). Conclusão: DA aumentou o risco de Problemas de Pensamento e Problemas de Sono. Não foi observada associação com a gravidade da doença.