



## Trabalhos Científicos

**Título:** Relato De Caso: Pancreatite Aguda Idiopática Na Infância

**Autores:** FERNANDA FORTUCI RESENDE BOTELHO (FACERES); PAULA FORTUCI RESENDE BOTELHO (UNIPLAC); NATÁSSIA ALBERICI ANSELMO (FACERES); HENRIQUE SILVA SOARES GUIMARÃES (FACERES); KÊNIA MARIA JORDÃO CAZON (FACERES); DIEGO BURGARDT (UNIPLAC)

**Resumo:** INTRODUÇÃO: A incidência de pancreatite aguda na infância é infrequente e as suas causas são diferentes e muito mais variadas que nos adultos, como: trauma abdominal, anormalidade do sistema pancreático duodenal, drogas, toxinas, infecções virais, doenças hereditárias, distúrbios metabólicos, e em até 25% dos casos a etiologia de pancreatite aguda na infância é desconhecida. DESCRIÇÃO DE CASO : Pré - escolar, sexo masculino, 6 anos e 2 meses de vida, previamente hígido, sem história pregressa de uso de medicamentos, exposição a drogas, icterícia, eliminação de ascaris, trauma abdominal, episódios álgicos anteriores ou hemopatia familiar. Iniciou há três dias um quadro clínico súbito de crises convulsivas Tônico-clônicas, vômitos, dor abdominal difusa, febre e prostração. Ao exame físico apresentava edema bi palpebral discreto, abdome distendido, doloroso a palpação difusa e presença de globo vesical. Ausculta pulmonar com murmúrio vesicular diminuído a direita. Exames laboratoriais de entrada: amilase (627g/dl); lipase (205mUI/ml); aminotransferase: TGO (161 mUI/ml) ,TGP (268 mUI/ml); triglicerídeos 167mg/dl; Leucócitos 17.500p/mm<sup>3</sup>, com bastões (8%), segmentados (70%), neutrófilos (78%) e apresentando grânulações tóxicas nos neutrófilos. Realizado RX de abdômen com suspeita de bolo de ascaris. No ultrassom de abdômen, apareceu distensão de alça colônica limitando a avaliação do pâncreas e vasos retroperitoneais. Devido à piora da evolução clínica, estado geral decaído e sem resposta ao tratamento terapêutico, foi realizada laparotomia exploradora evidenciando pancreatite aguda sem focos necrohemorrágicos. DISCUSSÃO: A Pancreatite aguda é uma patologia infrequente na infância e de difícil diagnóstico, ela pode, por vezes, causar potenciais complicações para o paciente, por isso o clínico deve ter conhecimento dessa doença para conseguir realizar o tratamento adequado. CONCLUSÃO: No relato de caso acima a conclusão só pode ser estabelecida após laparotomia exploradora tendo como resultado pancreatite aguda idiopática. Isso ocorreu devido aos exames laboratoriais e radiológicos terem sido inconclusivos e o quadro clínico pouco específico.