



Trabalhos Científicos

Título: Doença Celíaca E Síndrome De Rapunzel: Um Relato De Caso

Autores: LÍDIA MARIA OLIVEIRA BARISIC (UERN); LUCAS COSTA FEITOSA ALVES (UERN); MARINA ALBUQUERQUE BEZERRA DE ALMEIDA (UERN); CAMILA RAFAELLA NUNES ALVES (UERN); NADJANEYRE LINHARES CASIMIRO (UERN); LYLIAN KAROLINE ROSA BARROS DE OLIVEIRA (UERN); HUDNARA DANTAS DE AZEVEDO (UERN); SABRINA IDAYANY MONTEIRO LOURENÇO QUEIROZ (UERN); LAURA JANE LIMA ARAGÃO (UERN)

Resumo: Introdução: Na Síndrome de Rapunzel há tricobezoar gástrico estendendo-se ao intestino delgado, cursando com dor abdominal e náusea. Possível etiologia dessa síndrome é a doença celíaca (DC), enquanto patologia disabsortiva intestinal. A DC é uma desordem sistêmica de cunho imunológico causada por derivados de glúten e prolamina em indivíduos geneticamente suscetíveis. Descrição do caso: E.N.F., Sexo feminino, 7 anos, comparece ao ambulatório para investigação de dor abdominal, deficiente ganho de peso e quadros de diarreias associados à quadros de tristeza e baixo ânimo. Ao exame físico apresentava estado geral regular, hipocorada, astênica, com facies de sofrimento e tristeza. Baixa estatura e baixo peso para idade. No exame abdominal: circunferência abdominal de 60cm, sem visceromegalias. Restante do exame físico sem anormalidades. Foram realizados exames complementares com hemograma sugestivo de anemia ferropriva. A EDA mostrou tricobezoar gástrico e gastrite antral erosiva com focos hemorrágicos. A sorologia foi positiva para antitrasglutaminase, com IgA > 128 e IgG: 1,5. A biópsia foi conclusiva para enterite linfocítica com atrofia vilositária subtotal (Marsh IIIb), confirmando diagnóstico de DC. Para retirada do bezoar foi realizada laparotomia, com boa evolução pós operatória. A criança apresentava-se melhor com reposição de ferro, acompanhamento psicológico e restrições da dieta celíaca. Discussão: No caso relatado, a paciente foi diagnosticada com DC apresentando concomitantemente Síndrome de Rapunzel. Até o momento, somente quatro artigos na literatura relataram casos similares, dos quais, 03 associaram formação do bezoar à pica. Contudo, o relato mais recente relaciona DC e distúrbios psicológicos à formação do tricobezoar. Conclusão: No presente caso, considerando o histórico de sofrimento psicológico, provavelmente, trata-se de DC que levou a distúrbios psicológicos, cursando com tricotofagia e então Síndrome de Rapunzel. Corroborando com esse pensamento está o fato que a paciente apresentou significativa melhora com dieta livre de glúten e acompanhamento psicológico.