



## Trabalhos Científicos

**Título:** Perfil Dos Pacientes Pediátricos Submetidos A Protocolo De Morte Encefálica No Df.

**Autores:** ANDRÉA LOPES RAMIRES KAIRALA (UNICEUB); BRUNA ROLIM PEIXOTO DA SILVA (UNICEUB); MARCOS PAULO GONÇALVES CARLOS (UNICEUB); NATÁLIA RAMIRES KAIRALA (UNICEUB); LUIZ MATHEUS XAVIER COCENTINO (UNICEUB)

**Resumo:** INTRODUÇÃO: O perfil dos pacientes pediátricos em morte encefálica (ME) pode ajudar na identificação da população de maior risco e da causa de óbito, bem como auxiliar na proposição de medidas para evitar essas mortes. OBJETIVO: Descrever o perfil de crianças e adolescentes atendidos com diagnóstico de ME que foram incluídos no programa de Captação de Órgãos. MÉTODOS: estudo transversal/retrospectivo, onde foram analisados prontuários de crianças e adolescentes (N=146) em ME acompanhados pela equipe da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO) do Distrito Federal (DF), entre janeiro de 2013 e dezembro de 2016. RESULTADOS: Da população analisada, verificou-se predominância de adolescentes (51,4%), sexo masculino (67,8%) e cor parda (61,8%). No que se refere a faixa etária, foi observada uma semelhança de porcentagem entre escolares (18,5%) e lactentes (17,1%); apenas 12,3% de pré-escolares e 0,7% (N=1) recém-nascidos. Entre os motivos de internação e óbito verificou-se a predominância de causas externas (41,1%), dessas, 21,9% por atropelamento; 18,5% perfuração por arma de fogo e 0,7% enforcamento; e 13,7% por tumores cerebrais. Primeiro atendimento de 84,9% foi realizado na rede pública. Ao analisar onde o protocolo de ME foi iniciado, percebe-se aumento de indivíduos na rede pública (93,8%) sugerindo-se que os pacientes com agravamento da situação de saúde, foram transferidos para hospitais especializados da rede pública do DF. Quanto a captação verifica-se que 27% dos casos declarados foram por busca ativa pela equipe (COT-DF) sendo o restante por notificação da equipe assistencial (66,9%); em 6,1% dos prontuários não havia informação sobre esse dado. CONCLUSÃO: Levando-se em consideração que é uma amostra relacionada a CNCDO, o grupo de maior risco para morte prematura é o adolescente do sexo masculino, principalmente por causas externas, quase todas evitáveis. Sugere-se uma maior atenção à situação de segurança, educação e saúde dessa população pelas autoridades governamentais.