



Trabalhos Científicos

Título: Fatores De Risco Para O Desmame Precoce Entre Lactentes Atendidos Em Uma Unidade Básica De Saúde Na Cidade De Manaus (Am).

Autores: GRACIANE LIMA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS); JEFFERSON GUILHERME (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS); SILVANA BENZECRY (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS); IGOR VERAS (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS); FERNANDA COBAYASHI (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO); JULIANA MENESES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO)

Resumo: Introdução: É indiscutível a importância do leite materno como fonte nutricional exclusiva para a criança nos primeiros seis meses de vida. Dentre os vários benefícios evidenciam-se a diminuição e a prevenção da morbimortalidade infantil. Entretanto, o desmame precoce tem ocorrido à revelia das recomendações dos profissionais de saúde. Objetivo: Conhecer a prevalência da duração do aleitamento materno e dos fatores de risco para o desmame precoce entre crianças de zero a seis meses. Método: Foi realizado um estudo transversal, observacional e descritivo da prevalência da duração do aleitamento materno e identificação dos fatores de risco para o desmame precoce entre crianças de zero a seis meses atendidas no Centro de Atenção Integral à Criança Corina Batista, Manaus (AM), em que foram incluídos 404 lactentes cadastrados na referida unidade. Resultado: Os resultados mostraram que a prevalência do aleitamento materno exclusivo (AME) foi de 33,7%. Os principais fatores associados para o desmame precoce foram a menor escolaridade da mãe (RP: 1,17; IC95%: 1,03-1,33) e o uso de chupeta (RP: 1,42; IC95%: 1,27-1,62). Não foi observada diferença estatisticamente significativa entre o desmame e as seguintes características: peso do nascimento, tempo e local da primeira mamada na população estudada. Conclusão: Conclui-se que a prevalência da amamentação materna apresenta-se abaixo do esperado pela Organização Mundial de Saúde e os resultados do presente estudo confirmam a necessidade de projetos para Promoção e Apoio ao Aleitamento Materno na Cidade de Manaus, não só para aumentar a duração e prevalência da amamentação como, também, para retardar a introdução de complementos.