



## Trabalhos Científicos

**Título:** Síndrome Do Bebê Sacudido: Relato De Caso

**Autores:** PAULA BRAGATO FUTAGAMI (UNIOESTE-CASCADEL-PR); MARCELO TOHORU NAKAMURA (UNIOESTE-CASCADEL-PR); RENATA BRAGATO FUTAGAMI (UNIOESTE-CASCADEL-PR); MICHELLE SILVA ZENY (UNIOESTE-CASCADEL-PR); BERNARDO DE LIMA (UNIOESTE-CASCADEL-PR); GIORGIA PADILHA FONTANELLA (UNIOESTE-CASCADEL-PR); CARMEM MARIA COSTA MENDONÇA FIORI (UNIOESTE-CASCADEL-PR); MILENE MORAIS SEDREZ ROVER (UNIOESTE-CASCADEL-PR); FERNANDO CÁRITAS DE SOUZA (UNIOESTE-CASCADEL-PR); MARCOS ANTONIO DA SILVA CRISTOVAM (UNIOESTE-CASCADEL-PR)

**Resumo:** INTRODUÇÃO A Síndrome do Bebê Sacudido (SBS) ocorre quando o lactente passa por movimentos abruptos quando sustentado pelas extremidades ou pelos ombros, que podem lesar a coluna cervical do bebê e causar sangramentos como hematoma subdural/subaracnóideo e hemorragia retiniana, porém nem todas as vítimas irão apresentar essa tríade, podendo existir outras repercussões clínicas sugestivo da ocorrência do trauma. A SBS é responsável por uma taxa significativa de morbimortalidade e ocorre geralmente em crianças menores de 1 ano de idade. DESCRIÇÃO DO CASO M. F. R. M, feminino, Termo, admitida no HUOP com 9 dias de vida por gemência. Sinais vitais estáveis e exame físico sem alterações. Permaneceu internada por 8 dias, por suspeita de sepse tardia. Retornou novamente ao pronto socorro do HUOP 8 dias depois, por gemência e febre. Ao exame físico admissional, paciente estava em mal estado geral, fundoscopia com hemorragia retiniana, evoluindo no dia seguinte com 2 episódios de convulsões. Foi submetida à Tomografia de Crânio com achados sugestivos de SBS. Radiografia de tórax: fraturas de costelas. Abordado progenitores, os quais confessaram agressão física da lactente durante conflito conjugal anteriormente à primeira internação. DISCUSSÃO Na SBS, em casos menos graves, os sinais do trauma craniano violento podem mimetizar uma infecção viral, cólicas ou intolerância alimentar. A etiologia da SBS incluem fatores relacionados ao bebê, os situacionais e os relacionados ao cuidador. Fatores de risco: sexo masculino, idade < 1ano, história de prematuridade e baixo peso ao nascimento. O diagnóstico envolve história clínica e exames de imagem. A prevenção é um elemento chave na SBS, sendo que pediatras podem ter um papel de intervenção, através da compreensão reconhecimento da SBS. CONCLUSÃO A SBS representa uma forma específica de abuso físico infantil, a identificação precoce dos sinais de alerta identificados pelo médico são a chave para prevenção.