



## Trabalhos Científicos

**Título:** Prevalência De Leishmaniose Visceral Em Crianças Entre 1 A 14 Anos De Idade No Norte E Nordeste Do Brasil.

**Autores:** ANA CAROLINA CORDEIRO RIBEIRO (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); ANDREI ALVES PIRENEUS (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); MARCELO DE OLIVEIRA ZOCATELLI (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); RODRIGO LIMA ARAUJO (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); VINICIUS LAMONIER MELO (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); ANNE KAROLINE DE SOUSA E OLIVEIRA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); ANA CAROLINA MELO VALENTE (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); LETÍCIA DA COSTA LINS (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); DÉBORA ZVICKER DA SILVA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); JULYANA PEREIRA ANDRADE (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); THIAGO DE MOURA ARRUDA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); RAYSSA CLAUDIA OLIVEIRA DUARTE (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); JÚLIA RESENDE GONÇALVES (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); ELISA SOUZA DUARTE (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); LUANA LOPES BOTTEGA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); LUCAS COSTA DA ROCHA SILVA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); IBRAHIM DAOUD ELIAS FILHO (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); THAIS CAROLINA HITA AZEVEDO (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); JESSICA ALVES BRITO (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); MARIA ANTONIETA DA SILVEIRA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG)

**Resumo:** Introdução: A leishmaniose visceral é uma doença infecto-parasitária com peculiaridades próprias e caracterizada pelo envolvimento sistêmico que acomete milhares de indivíduos em regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo. Objetivo: Analisar a prevalência de casos de leishmaniose visceral entre a faixa etária de menores de 1 a 14 anos de idade e também entre os sexos fazendo um comparativo entre as regiões norte e nordeste. Métodos: Consiste em um estudo transversal epidemiológico transcritivo com enfoque quantitativo, realizado em ambos os sexos na faixa etária entre menores de 1 a 14 anos segundo dados confirmados de notificação do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Resultado: O quantitativo (n=2347) representa as notificações por leishmaniose visceral na região norte, entre menores de 1 e 14 anos de idade. Sendo 50,92% (n=1195) do sexo masculino e 49,08% (n=1152) do sexo feminino e a maior prevalência de casos ocorreu entre 1 e 4 anos de idade, em ambos os sexos. Em relação a região nordeste, os casos de leishmaniose visceral correspondem ao número relativo de (n=6188) na mesma faixa etária relatada, no qual 51,49%(n=3186) representa o número de casos do sexo masculino e 48,51% (n=3002) o sexo feminino, a maior prevalência também foi observada na faixa etária de 1 a 4 anos de idade, em ambos os sexos. Conclusão: A prevalência de internações oriundas da leishmaniose visceral foi de (n=2347) na região norte e (n=6188) na região nordeste; mostrando-se assim um predomínio da região nordeste em relação a região norte, no que tange ao número de casos notificados e apresentados pelo DATASUS. E evidenciou-se que a faixa etária predominante foi de 1 a 4 anos de idade.