



Trabalhos Científicos

Título: Hemofilia A Com Manifestação No Período Neonatal: Relato De Caso

Autores: MARIANA GASPAR MENDONÇA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA); LUCIANA MENDONÇA SICONE (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA)

Resumo: Introdução Hemofilia A é uma doença hemorrágica hereditária ligada ao cromossomo X caracterizada pela deficiência ou anormalidade da atividade coagulante do fator VIII. A prevalência é de um caso em cada 5.000 a 10.000 nascimentos do sexo masculino. Na maioria dos pacientes é diagnosticada ao nascimento relacionada história familiar, entretanto em aproximadamente um terço dos pacientes a ocorrência representa uma nova mutação. O tratamento é baseado na reposição do fator VIII. Descrição do Caso Recém-nascido masculino, a termo, nascido de parto vaginal. Mãe primigesta e sem história familiar de doenças. Durante o período expulsivo foi relato pelo Obstetra uma distócia de ombro direito. Foi examinado pelo Pediatra na sala de parto não apresentando alterações no exame físico. Nas primeiras 42 horas de vida evoluiu com aparecimento de equimoses em membros superiores esquerdos e perna esquerda, hematoma em região clavicular direita e hematoma supraumbilical +/- 2 cm. A radiografia de tórax mostrou a presença de fratura em terço médio de clavícula direita. Iniciou-se uma investigação, sendo encontrado nos exames laboratoriais: o alargamento do tempo de tromboplastina parcial ativado com dosagem de fator VIII: 1%. Foi iniciada a reposição com fator VIII recombinante. O neonato apresentou melhora das lesões cutâneas e segue em acompanhamento com a hematologista pediátrica. Discussão Na hemofilia o fator VIII encontra-se reduzido, não propiciando que a hemostasia secundária, associada à rota intrínseca da coagulação, ocorra. Com isso, possibilita o aparecimento de sangramentos. O diagnóstico precoce da hemofilia está relacionado à melhora da qualidade de vida e a diminuição de sequelas, já que o tratamento de escolha na maior parte dos lugares tem sido o profilático, que neste caso foi iniciado já no primeiro mês de vida, antes de qualquer hemorragia articular. Conclusão A hemofilia deve ser sempre lembrada em neonatos com manifestações hemorrágicas, como hematomas, equimoses e sangramento aumentado após punções.