



Trabalhos Científicos

Título: Lactobezoar Ileal

Autores: RANIELY BULLERJHAN SCHMIDT (HOSPITAL INFANTIL ESTADUAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA); JULIANA NEVES FERREIRA (HOSPITAL INFANTIL ESTADUAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA); FLÁVIA MESQUITA GAVA (HOSPITAL INFANTIL ESTADUAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA); THALITA VERVLOET GOMES (HOSPITAL INFANTIL ESTADUAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA); LARA PIGNATON PERIM (HOSPITAL INFANTIL ESTADUAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA); ROBERTA ROLDI (HOSPITAL INFANTIL ESTADUAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA); RENATA MENDES RODRIGUES DE OLIVEIRA (HOSPITAL INFANTIL ESTADUAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA); SUELLEN PIMENTEL DE BARROS (HOSPITAL INFANTIL ESTADUAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA); LEANDRO ODONE BERTELLI (HOSPITAL INFANTIL ESTADUAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA); SOFIA FILIPPE MARIANI (HOSPITAL INFANTIL ESTADUAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA); ANA CAROLINA RIBEIRO CORREA (HOSPITAL INFANTIL ESTADUAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA)

Resumo: Introdução: Bezoar é a impactação de material estranho não digerido no interior do trato digestivo, originado a partir da ingestão de diversas substâncias, como cabelos (tricobezoar), fibras vegetais (fitobezoar), medicamentos (farmacobezoar), componentes do leite (lactobezoar) dentre outros. Frequentemente localizados no estômago, podem se estender ao intestino, sendo importante causa de abdome agudo obstrutivo na população pediátrica. A proposta deste trabalho é de relatar o caso clínico de um volumoso lactobezoar ileal diagnosticado em lactente internado em Hospital Pediátrico com quadro de distensão abdominal a esclarecer. Descrição de caso: Lactente, três meses, com história de prematuridade e distensão abdominal importante após início de fórmula láctea. Ao exame físico, massa palpável, de consistência endurecida em fossas ilíacas. Aventada hipóteses de megacólon congênito, mucoviscidose, alergia a proteína do leite e enterocolite. Afastada a hipótese de megacólon e patologias cirúrgicas agudas, submetido a tratamento clínico com antibióticos e posteriormente, lavagem intestinal, acetilcisteína e lactulose via oral, com resposta parcial. Evoluiu com piora clínica súbita, submetido a laparotomia exploradora e diagnosticado com lactobezoar ileal obstruindo a luz intestinal. Apresentou choque séptico refratário, evoluindo a óbito. Discussão: Originados principalmente por componentes do leite, muco e produtos alimentares não digeridos, os lactobezos localizam-se tipicamente no estômago, podendo acometer outros segmentos intestinais. São afecções raras que diferem dos outros tipos de bezoares por incidirem preferencialmente em lactentes, nascidos pré-termo. Manifesta-se clinicamente com sinais de obstrução intestinal e massa palpável. É diagnosticado por meio de anamnese detalhada aliada a exame físico e de imagem. A maioria dos casos é tratada cirurgicamente, podendo ser tentado tratamento clínico em pacientes com obstrução intestinal parcial. Conclusão: Lactobezoar apesar de raro e pouco diagnosticado, é um importante diagnóstico diferencial de abdome agudo obstrutivo em lactentes jovens. Torna-se importante o conhecimento dessa patologia para o diagnóstico precoce e tratamento adequado.