



Trabalhos Científicos

Título: Incidência De Artrite Idiopática Juvenil, De 2008 A 2017, No Estado Do Tocantins Em Comparação Ao Brasil

Autores: ANA CAROLINA CORDEIRO RIBEIRO (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); ANDREI ALVES PIRENEUS (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); ELISA SOUZA DUARTE (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); LUANA LOPES BOTTEGA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); ANA CAMILA RAMALDES (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); NAYANNE GOMES FIGUEIREDO (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); MAIARA DANIELLE SANTOS SILVA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); ANNE KAROLINE DE SOUSA E OLIVEIRA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); VINICIUS LAMONIER MELO (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); ANA CAROLINA MELO VALENTE (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); LETÍCIA DA COSTA LINS (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); DÉBORA ZVICKER DA SILVA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); JULYANA PEREIRA ANDRADE (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); THIAGO DE MOURA ARRUDA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); RAYSSA CLAUDIA OLIVEIRA DUARTE (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); JÚLIA RESENDE GONÇALVES (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); IVO SALVIANO PINTO NETO (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); LUCAS COSTA DA ROCHA SILVA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); IBRAHIM DAOUD ELIAS FILHO (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); ROSÂNGELA MARIA GIOVELLI DA SILVEIRA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG)

Resumo: Introdução:A artrite idiopática juvenil é um grupo de doenças crônicas de etiologia desconhecida que ocorrem em crianças e adolescentes. Essa doença, por ser crônica, traz grandes impactos para a vida do paciente e seus familiares, tanto físicos, emocionais, sociais, educacionais e econômicos. Objetivo:Descrever a incidência dos casos de artrite idiopática juvenil em crianças de 0 a 14 anos, no período de 2008 a 2017. Método:Estudo epidemiológico descritivo da incidência de artrite idiopática juvenil, na faixa etária até 14 anos, no período de 2008 a 2017 com dados extraídos no banco de dados do ministério da saúde, DATASUS, agrupados e analisados. Resultados:Foram notificados 305 casos de artrite idiopática juvenil em crianças de 0 a 14 anos no período de 2008 a 2017 no estado do Tocantins. A faixa etária mais acometida são crianças de 10 a 14 anos, seguida da faixa etária de 5 a 9 anos. No Brasil essa incidência também se repete, com 9064 casos de 10 a 14 anos e 8110 casos em crianças de 5 a 9 anos. Entretanto, casos ocorridos, no período em questão, podem ter sido subnotificados, prejudicando a pesquisa. Conclusão:A artrite idiopática juvenil em crianças com a faixa etária de 10 a 14 anos deve-ser ter um maior cuidado para o diagnóstico não passar despercebido, afim de um melhor resultado no tratamento e menor impacto na vida da criança e seus familiares. Assim, é necessário que vários âmbitos se unam para ajudar no diagnóstico precoce, seja ele: família, escola e governo. Através de campanhas, palestras em escolas, os familiares podem entender melhor da doença e procure um médico especialista.