



Trabalhos Científicos

Título: A Incidência De Hpv Na Adolescência E A Consequência Futura: Câncer De Colo De Útero.

Autores: ANA CAROLINA CORDEIRO RIBEIRO (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); ANDREI ALVES PIRENEUS (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); ANA CAMILA RAMALDES (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); VINICIUS LAMONIER MELO (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); ANNE KAROLINE DE SOUSA E OLIVEIRA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); ANA CAROLINA MELO VALENTE (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); LETÍCIA DA COSTA LINS (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); DÉBORA ZVICKER DA SILVA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); JULYANA PEREIRA ANDRADE (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); THIAGO DE MOURA ARRUDA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); RAYSSA CLAUDIA OLIVEIRA DUARTE (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); GONÇALVES JR RESENDE GONÇALVES (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); IVO SALVIANO PINTO NETO (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); ELISA SOUZA DUARTE (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); MAIARA DANIELLE SANTOS SILVA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); NAYANNE GOMES FIGUEIREDO (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); ANA CAMILA RAMALDES (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); MARCELO DE OLIVEIRA ZOCATELLI (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); RODRIGO LIMA ARAUJO (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG); ROSÂNGELA MARIA GIOVELLI DA SILVEIRA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG)

Resumo: Introdução: O HPV é um vírus que recebe o nome de papilomavírus humano, sendo transmitido sexualmente e constituindo hoje um problema de saúde pública, o câncer de colo de útero, que tem a principal causa repousada sobre esse vírus. Objetivo: analisar os casos de HPV que englobam a faixa etária adolescente – que segundo o ECA são os cidadãos de 12 a 18 anos de idade, e suas implicações futuras, sendo o maior exemplo, o câncer de colo de útero. Método: revisão bibliográfica. Resultados: O papilomavírus humano é um vírus transmitido sexualmente, sendo associado com o aparecimento de tecido neoplásico no útero de mulheres, em grande maioria na faixa de 21-30 anos de idade. A relação com a adolescência se sustenta no fato de que as mulheres adquirem o HPV nessa fase devido a diversos fatores: o desconhecimento da doença por uma falha educacional, o início da vida sexual precoce (13 – 17 anos) principalmente por influência da mídia, o alto número de parceiros sexuais e a falta de proteção são os que merecem destaque. Conclui-se que, a prevenção com o uso de preservativo e a vacina no início da vida sexual são ainda, o melhor método para a diminuição da doença e consequentemente, do possível aparecimento dos casos de câncer de colo de útero na idade adulta. Foi atestado ainda que, os jovens precisam passar por um processo de reeducação sexual, uma vez que é relatado na maioria dos estudos que estes fazem o uso da camisinha para evitar gravidez indesejada, e não para prevenção do HPV ou outras doenças sexualmente transmissíveis.