



Trabalhos Científicos

Título: Herpes Neonatal: Relato De Caso Em Um Hospital De Marituba, Pa, Brasil.

Autores: EDILENE SILVA DA COSTA (CESUPA); BÁRBARA FREITAS COELHO (CESUPA); CARLOS WAGNER MACHADO PEREIRA (UFPA)

Resumo: INTRODUÇÃO: O Herpes Neonatal decorre da exposição ao vírus Herpes simplex (HSV) tipo 1 ou 2 durante a gestação (5%), periparto (85%) ou pós-parto (10%). As duas últimas não diferem entre si, e evoluem geralmente de forma grave, principalmente se o tratamento for tardio ou não realizado. São descritas três formas de apresentação, que podem se sobrepor. a) Localizada em pele e mucosa b) Sistema Nervoso Central (SNC) c) Disseminada. DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO: RN nascido de parto vaginal, a termo, chorou ao nascer, apgar 8/9, sem intercorrências, proveniente de seu domicílio com história de secreção ocular purulenta em abundância, febril, recusa alimentar, hipoatividade, eupneico. Internado no 6º dia de vida, em UCI Neonatal. DISCUSSÃO: Dia de Internação 2: RN em mal estado geral, apresentando lesões crostosas com fluido fibrótico em couro cabeludo e vesículas pustulosas em face, pescoço e tórax superior. Foi colhida propedêutica de acordo com a disponibilidade do Serviço, e iniciado Aciclovir, e, mantido por 14 dias, após resultado positivo para células herpéticas no teste de Tzanck, e resultado negativo da pesquisa de DNA viral no sangue periférico e LCR. Os testes para avaliação hematológica, renal e hepática não mostraram alterações. Sendo assim, Lactente evoluiu com resolução dos sintomas e sem lesões residuais e com proposta de seguimento ambulatorial pela Infectologia Pediátrica. CONCLUSÃO: A infecção pelo HSV Neonatal é de ocorrência incomum, porém associada à alta morbimortalidade, quando não tratada precocemente. Embora, a doença em forma de pele e mucosa possa se apresentar de forma benigna, ao não ser tratada possa evoluir para formas graves, com acometimentos do SNC. A precoce terapia deve basear-se em elevado índice de suspeita por parte do examinador, história materna, característica das lesões e época de aparecimento.