Trabalhos Científicos

Título: Púrpura De Henoch Schonlein: Relato De Caso

Autores: THAIS BURITY S VIANA (IDOR); LUANA RIBEIRO DE CASTRO (IDOR); MARIA FERNANDA DE MELO MOTTA (IDOR)

Resumo: Introdução: A Púrpura de Henoch Schonlein (PHS) é a vasculite sistêmica mais comum, 90% dos casos ocorrem em crianças, sendo a faixa etária de 4 a 6 anos mais frequentemente acometida, com predomínio em meninos. Descrição do caso: Pré-escolar previamente hígido apresentou quadro de máculas e pápulas hiperemiadas em membros inferiores (MMII) com edema e dor em cotovelo direito e punho esquerdo. Após três dias evoluiu com aumento progressivo do tamanho das lesões e aparecimento de máculas em membros superiores, associado à dor e edema de tornozelos, que dificultavam a deambulação; relatava quadro prévio de infecção de vias aéreas superiores, mas não sabia precisar a data, negava febre e outros sintomas. No quarto dia procurou serviço de emergência quando verificou-se lesões purpúricas palpáveis em borda anterior de braço direito e metade distal das pernas, além de edema e dor à palpação em tornozelos. Sem outras alterações ao exame. Exames laboratoriais demonstraram proteína C reativa discretamente aumentada (PCRt =1,5), sem outas alterações. Indicada internação hospitalar para observação e controle da dor. Recebeu hidratação venosa e dipirona, evoluiu com resolução do quadro álgico e melhora significativa das lesões purpúricas. Discussão: A PHS é autolimitada na maioria dos casos e é caracterizada por um conjunto de sintomas variáveis em apresentação e tempo de ocorrência. O aspecto mais marcante é a presença de púrpura (geralmente palpável) ou petéquias, com predomínio em MMII, sem trombocitopenia ou coagulopatia, associado à pelo menos um dos seguintes: dor abdominal, artrite ou artralgia, e doença renal. A evolução dos sintomas pode levar de dias a semanas, e na maioria dos casos a doença é precedida por sintomas respiratórios. Conclusão: Os pediatras devem estar atentos aos sintomas da PHS pois o reconhecimento precoce e o tratamento adequado podem atenuar os sintomas e limitar os danos aos órgãos-alvo.