



## Trabalhos Científicos

**Título:** As Intercorrências Pré E Perinatais Mais Prevalentes Em Síndrome De Down.

**Autores:** PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA UCHÔA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); ÍTALO BARBOSA DA SILVA (CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS); FILIPE LINS LINHARES DE SOUSA (CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS); JULIANA GUERREIRO MOTA (CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS); ELLAINE DÓRIS FERNANDES CARVALHO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ)

**Resumo:** Introdução: A Síndrome de Down (SD) é uma desordem genética que pode associar-se a algumas alterações, como atrasos no desenvolvimento e outras morbidades, sendo influenciadas pelas características e ocorrências maternas, gestacionais e neonatais. Objetivo: Avaliar quais são as intercorrências pré e perinatais mais prevalentes em pacientes portadores de SD. Métodos: É um estudo retrospectivo e quantitativo com análise de prontuários de pacientes com SD em uma instituição de Fortaleza-Ceará. Os dados da pesquisa são coletados em uma ficha do pesquisador e analisados pelo software SPSS v 23. Resultados: A amostra conta com 261 pessoas portadoras de SD e com base nos dados coletados nos prontuários, questionava-se sobre a presença ou não de intercorrências, e pode-se constatar que 143 pacientes tiveram alguma complicação e 88 não tiveram. Desses, os tipos de complicações mais predominantes, podendo o paciente apresentar mais de uma intercorrência, e o número pacientes da amostra coletada que possuíam detalhamento sobre o assunto são: 60 (30,8%) pacientes com icterícia, 24 (12,3%) pessoas com mães que tiveram hipertensão, 19 (9,7%) referem sangramento gestacional, 17 (8,7%) indivíduos com cianose, 16 (8,2%) com Insuficiência respiratória, 13 (6,7%) prematuros, 7 (3,6%) pacientes em sofrimento fetal, 7 (3,6%) relatam tabagismo materno em seus prontuários, 6 (3,0%) com oligoidrânio, 3 (1,5%) com plaquetopenia, 3 (1,5%) pessoas com polidrânio, 3 (1,5%) informam hepatite B gestacional, 2 (1,0%) pacientes com hipoglicemia neonatal, 2 (1,0%) indivíduos que apresentam convulsão e as demais intercorrências citadas são etilismo materno, hidrocefalia, infecções maternas, toxoplasmose gestacional, zika gestacional, entre outros, que tiveram apenas um paciente em cada. Conclusão: Entre as intercorrências dos pacientes com SD, as mais prevalentes são icterícia, hipertensão materna, sangramento gestacional, cianose, insuficiência respiratória e prematuridade.