



Trabalhos Científicos

Título: Perfil Nutricional De Crianças Com Alergia A Proteína Do Leite De Vaca – APLV, Atendidas Em Um Ambulatório De Referência Do Rio Grande Do Norte.

Autores: LORENA DOS SANTOS TINÔCO (HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES); RENILSON RODRIGUES SILVA (HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES); RITA XAVIER BARBOSA NETA SILVA (HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES); EPIFANIA CLARINDA DE ALMEIDA REGO (UNIRN)

Resumo: A alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é o tipo de alergia alimentar mais frequente entre crianças de zero até vinte e quatro meses e se caracteriza pela resistência do sistema imunológico às proteínas do leite. Tendo em vista que a procura das formulas para a APLV, nos ambulatórios de referência vem se tornando frequente, foi realizado um levantamento de informações das crianças do Programa de Avaliação da Indicação e Uso de Fórmulas Infantis Especiais para Alergia à Proteína do Leite de Vaca (PAIUFA). Buscando assim entender as características clínica dos assistidos nos ambulatórios pediátricos públicos de Natal/RN. Foi desenvolvido o estudo em dois ambulatórios específicos para pacientes com APLV pediátricos públicos, no período de Agosto a Novembro de 2016, o mesmo foi constituído por 59 prontuários de crianças, que estão inscritas no (PAIUFA), na faixa etária de zero a três anos, residentes em Natal e interior do estado do RN. No acompanhamento antropométrico, avaliaram - se, o peso e altura ao nascer, segundo OMS-2006 para avaliar o estado nutricional. A faixa de idade de início dos sintomas foi de 1 mês à 26 meses, embora acometidas por sinais e sintomas envolvendo simultaneamente distintos sistemas, manifestações isoladas do sistema digestório 91,5%, da pele 67,8% e do trato respiratório 32,3%. De acordo a avaliação do estado nutricional pelo escore Z do IMC evidenciou magreza e eutrofia, para o parâmetro Estatura/Idade observamos que a maioria das crianças apresentou muito baixa estatura para idade, no que diz respeito ao Peso/Idade mostrou que a grande maioria das crianças do grupo de 0 a 6 meses estão com muito baixo peso para idade e em relação ao indicador Peso/Estatura todas as crianças do estudo estão com magreza acentuada. Observou-se também neste estudo que a diarreia está presente na maioria dos sintomas referidos.