Trabalhos Científicos

Título: Avaliação Das Lesões De Pele Em Recém-Nascidos De Uma Unidade Neonatal

Autores: MARIA IZÉLIA GOMES (MEAC); NARA LIMA PINHEIRO DA SILVA (MEAC); VIVIAN SOUSA CAVALCANTI (MEAC); THAYS BEZERRA BRASIL (MEAC); VERIDIANNE VASCONCELOS PONTE VIANA (MEAC); MARIA CECILIA FREITAS CESARINO DOS SANTOS (MEAC); ROBERTA STEPHANIE SOUSA BANDEIRA (MEAC); EVELYNE LOBO GURGEL (MEAC); DENISE MAIA ALVES DA SILVA (MEAC); PATRICIA LINARD AVELAR (); SOCORRO ALANA RAMALHO ROCHA (MEAC); CHARLENE FERNANDES BAIMA (MEAC); HEVYLA SANDY COSTA LIMA (MEAC); ANA PAULA MELO FAÇANHA (MEAC); JULYANE MARIA OLIVEIRA LIMA (MEAC); MYLENA NONATO COSTA GOMES (MEAC); REBECA SILVEIRA ROCHA (MEAC); CLAUDIA BASTOS DA SILVEIRA REIS (); ROBERTA PINHEIRO FERREIRA (MEAC); ELOAH DE PAULA PESSOA GURGEL (MEAC)

Resumo: INTRODUÇÃO: a manutenção da integridade da pele do RN, apesar de ser um desafio para os profissionais que atuam em Unidade Neonatal, deve ser priorizada durante o cuidado, pois contribui para o aumento das chances de sobrevivência destes pacientes. OBJETIVO: Descrever a prevalência e fatores causadores associados a lesões de pele em recém-nascidos internados em uma Unidade Neonatal. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo e de abordagem quantitativa, realizado com 522 neonatos de maio a dezembro de 2016 internados em uma Unidade Neonatal de Fortaleza-CE. Os dados foram colhidos por instrumentos padrão da instituição para notificação e acompanhamento de lesões de pele. Os dados foram analisados pelo programa EpiInfo 7.2.1. Obteve-se aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (Nº 2.081.752). RESULTADOS: Dos neonatos internados, 38 desenvolveram lesões de pele, sendo destas as mais prevalentes: dermatite de fralda (18 - 47,2%), cirúrgica (11 - 28,8%), hematoma por punção (4 - 13,5%). Entre os fatores causadores das lesões, destacaram-se a umidade (14 - 36,8%) e prematuridade (2 - 5,7%). CONCLUSÃO: Os resultados desta pesquisa evidenciam a necessidade da utilização de instrumentos que visem a manutenção da integridade da pele do recém-nascido, podendo ser ferramentas úteis para identificar qualquer alteração no sistema tegumentar do neonato e assim prevenir ou diminuir sua prevalência e suas consequências.