



Trabalhos Científicos

Título: Perfil De Recém-Nascidos Que Receberam Cateter Central De Inserção Periférica Em Uma Unidade Neonatal

Autores: THAYS BEZERRA BRASIL (MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND); VIVIAN SOUSA CAVALCANTI (MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND); NÁGELA MARIA COSTA (MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND); ROBERTA PINHEIRO FERREIRA (MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND); SANDRA MARA CHAVES BARREIRA (MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND); CLÁUDIA BASTOS DA SILVEIRA REIS (MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND); CECÍLIA BEZERRA GOMES DA SILVA (MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND); MARIA CECÍLIA FREITAS CESARINO (MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND); SOCORRO ALANA RAMALHO ROCHA (MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND); PATRÍCIA LINARD AVELAR (MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND); DENISE MAIA ALVES DA SILVA (MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND); EVELYNE LOBO GURGEL (MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND); HEVYLA SANDY COSTA LIMA (MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND); REBECA SILVEIRA ROCHA (MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND); NARA LIMA PINHEIRO DA SILVA (MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND); CHARLENE FERNANDES BAIMA (MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND); JOCÉLIA MARIA DE OLIVEIRA (MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND)

Resumo: INTRODUÇÃO: O Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) vem sendo muito utilizado em neonatos hospitalizados por reduzir o risco de infecção, dentre outras vantagens. OBJETIVO: Descrever o perfil dos recém-nascidos (RNs) que receberam Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) em uma Unidade Neonatal. MÉTODO: Trata-se de um estudo transversal e descritivo, de abordagem quantitativa. Compuseram a amostra do estudo 458 PICCs inseridos em RNs na Unidade Neonatal de uma maternidade de referência no estado do Ceará, no período de janeiro de 2016 a janeiro de 2017. Foram resguardados nesta pesquisa os princípios éticos, conforme autorização do Comitê de Ética (Nº 2.081.752). RESULTADOS: A maioria dos neonatos era do sexo masculino (233 - 50,87%), pré-termo de acordo com a idade gestacional (365 - 79,69%), sendo a indicação predominante para implantação do PICC a necessidade do uso de antibiótico por tempo prolongado (318 - 69,43%) e a necessidade de infusão de Nutrição Parenteral Total (295 - 64,41%). CONCLUSÃO: Destaca-se a relevância do conhecimento do perfil dos recém-nascidos que receberam o Cateter Central de Inserção Periférica em uma Unidade Neonatal, como fator significativo para o planejamento e implementação de cuidados voltados para a melhoria da qualidade da assistência dos RNs que necessitam de acesso vascular.