



Trabalhos Científicos

Título: Torcicolo Adquirido E Diplopia: Sintomas Ominosos No Contexto De Cefaleia Infantil – A Propósito De Um Relato De Caso

Autores: LARISSA GALAS JUSTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI); ANANNANDY CUNHA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI); BÁRBARA PINHEIRO GAMA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI); ÍVINA MOURÃO LOBO MELO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI); JOSÉ MATEUS DE SOUZA RIBEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI); LUIZ SABINO ALVES JÚNIOR (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI); VANESSA FEIJÓ ANDRADE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI); NARA LÍVIA REZENDE SOARES (IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO - ISCM-SP); RICARDO SILVA PINHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP); MARCELO MASRUHA RODRIGUES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP); GIULIANO DA PAZ OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP)

Resumo: Introdução: As causas para torcicolo adquirido incluem acometimentos musculares, ósseos, articulares, oftalmológicos, psiquiátricos e neurológicos, podendo ser um sinal clínico para anomalias importantes na medula espinhal e no cérebro, como seringomielia ou neoplasias do sistema nervoso central. Descrição do caso: criança do sexo masculino, 7 anos, atendida em ambulatório de Neurologia Infantil de um hospital escola por queixa de cefaleia holocraniana com piora progressiva há 4 semanas, que evoluiu após 2 semanas com diplopia pior à mirada inferior e torcicolo com inclinação da cabeça para a direita. Não havia restrição da mobilidade cervical. A mobilização passiva do pescoço para correção do torcicolo ocasionava piora da diplopia. Ao exame neurológico, apresentava papiledema e paralisia isolada do nervo troclear esquerdo. A tomografia computadorizada (TC) de crânio mostrou processo expansivo em tronco com extensão para hemisfério cerebelar esquerdo, sem realce ao contraste. A ressonância magnética (RM) de crânio revelou, por sua vez, formação expansiva heterogênea que compromete o tronco cerebral, centrada na ponte, com extensão ao cerebelo, com realce ao gadolínio no componente cerebelar. Segue o acompanhamento atual em centro oncológico terciário. Discussão: O conjunto dos achados sugere a possibilidade diagnóstica de tumor difuso de tronco associado a neoplasia glial de baixo grau em hemisfério cerebelar esquerdo. Conclusão: É importante considerar neoplasia do sistema nervoso central como possível etiologia de cefaleia na infância que curse com torcicolo adquirido e diplopia.