



Trabalhos Científicos

Título: Associação Da Autoeficácia Materna E Fatores Associados Com O Uso De Chupeta No Primeiro Mês De Vida Da Criança

Autores: JUCILENE CASATI LODI (FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA - FOP/UNICAMP); LUCIANE MIRANDA GUERRA (FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA FOP/UNICAMP); ROSANA FÁTIMA POSSOBON (FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA FOP/UNICAMP)

Resumo: Introdução: O aleitamento materno é o melhor alimento para promover o crescimento e desenvolvimento adequado. Entretanto, a falta de confiança materna em sua capacidade de amamentar, pode propiciar a mulher a introduzir a chupeta, podendo levar ao desmame precoce. Objetivo: Avaliar o nível de autoeficácia à amamentação-Short Form (BSES-SF) durante o puerpério imediato, e os fatores associados ao uso de chupeta no primeiro mês de vida da criança. Metodologia: O estudo foi de coorte, com 210 mulheres pertencentes as Unidades de Saúde da Família (USF). Foram abordadas no grupo de gestante da USF para coletar as informações socioeconômicas, demográficas e data provável do parto (DPP). De acordo com a DPP era realizado uma nova abordagem via telefone, até 10 dias após o parto, para responder o instrumento de BSES-SF, junto com as informações obstétricas e no 30^a dia, para verificar a prática da amamentação e o uso da chupeta. Foi realizada análise bivariada, no nível de significância de 5%, para testar a associação entre a variável dependente (uso de chupeta) e as variáveis independentes (socioeconômicas, demográficas, obstétricas e escala da autoeficácia). Resultados: Mulheres que tiveram parto prematuro, com complicações maternas e não estavam em aleitamento materno exclusivo no trigésimo dia de vida, somados com a dificuldade na lactação, estavam usando chupeta em seus filhos no final do primeiro mês. A BSES-SF, não apresentou associação com o uso da chupeta. Conclusão: O uso da BSES-SF no puerpério imediato não influenciou o uso da chupeta no trigésimo dia, entretanto, esse instrumento pode ser importante para auxiliar os profissionais de saúde a conhecer as dificuldades das mulheres e auxiliá-las a evitar o uso da chupeta, através das variáveis já conhecidas que facilitam a sua introdução e, conseqüentemente favorecem o desmame precoce.