Trabalhos Científicos

Título: Perfil De Mortalidade Por Doenças Diarreicas E Gastroenterite Em Menores De 5 Anos Na Região Nordeste Em Comparação Com O Resto Do País.

Autores: LÍVIA LIBERATA BARBOSA BANDEIRA (UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA); CAMYLLA SANTOS DE SOUZA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); CAROLINE SBARDELLOTTO CAGLIARI (UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL); PATRÍCIA PAMPURI LOPES PERES (UNIVERSIDADE CIDADE SÃO PAULO); KALINY OLIVEIRA PEIXOTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE); HELENA GRACIELLI DE CARVALHO ALMEIDA (UNIFOR); SAMARA PEREIRA DE ALMEIDA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO); ANA ELOÍSA MELO NOVAES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE); ANNA KAROLINE VASQUES DE ALMEIDA (UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO); MAYKON WANDERLEY LEITE ALVES DA SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS); VICTORIA FIGUEIREDO JUNGER (UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO); REBECCA CRUZ DE MORAES REGO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO); STHEFANIA SAD SILVA FERREIRA RODRIGUES FRUET (UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO); LOANA DA FONSECA TORTORA (UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO); JOÃO DAVID DE SOUZA NETO (HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES)

Resumo: Introdução: Gastroentrerite é utilizado para definição das patologias que possuem a diarreia como principal manifestação. Esta é a segunda causa de morte entre as crianças menores de 5 anos no Brasil e representa um indicador de sáude capaz de nortear políticas de sáude locais. Objetivo: Analisar a mortalidade por doenças diarreicas em <5 anos no Nordeste, comparando com o restante do país. Métodos: Revisão sistemática da literatura no banco de dados SciELO e WHO, bem como estudo com dados do DATASUS, de 2011-2015. Foram considerados óbitos de <5 anos no Brasil segundo região em categoria CID-10:A09. Resultados: De 2011 a 2015, ocorreram 378 óbitos por diarreia e gastroenterite no Nordeste em menores de 5 anos, sendo a Bahia o estado que apresentou maior número de casos (50), seguido de Pernambuco (37) e Maranhão (25), sendo o menor número na Paraíba (1). Considerando a taxa de mortalidade, Sergipe apresentou a maior (0,55), seguido de Alagoas (0,22) e Pernambuco (0,18), enquanto a Paraíba, a menor (0,02). Em relação às outras regiões, o Norte foi o 2º do Brasil, abaixo do Nordeste, com 112 casos. Registraram-se mais óbitos no Pará (45) e em Roraima (17), estado este que também apresentou maior mortalidade (0,74), seguido do Amapá (0,69). Em 3º lugar, veio a região Sudeste (64), destacando-se São Paulo (33 óbitos e taxa de 0,11) e Minas Gerais (21 óbitos e taxa de 0,10). Centro-Oestes veio em seguida, com 24 óbitos, destacando-se Mato Grosso do Sul (15), com taxa de 0,34. Por último, veio o Sul (14 óbitos), destacando-se Santa Catarina (6), com taxa de 0,12. Conclusão: A mortalidade por diarreia e gastroenterite foi verificada por regiões e o Nordeste destacou-se com o maior número de casos, o que evidencia a urgência de medidas intervencionistas.